



ANEXO ESTADÍSTICO 81

Notas al cuadro del Anexo

Leyenda

En el cuadro se utilizan los siguientes signos convencionales:

.. = no se dispone de datos 0 o 0,0 = nulo o insignificante

Celda vacía = no se aplica

Las cifras presentadas en el cuadro del anexo pueden diferir de las fuentes originales de los datos por haberse redondeado o como consecuencia del procesamiento de los datos. Para separar los decimales de los enteros se usa una coma (,).

Notas técnicas

Prevalencia del retraso del crecimiento infantil

Fuentes: Banco Mundial, OMS y UNICEF, 2012, y Naciones Unidas, 2011b. En lo que respecta a los países, las observaciones se refieren al año más reciente disponible. (A) indica que las cifras totales regionales (para Asia central y meridional) son estimaciones de la FAO basadas en los datos presentados y los pesos de la población según la edad (Naciones Unidas, 2011b). El resto de las cifras regionales totales son estimaciones modeladas para 2010 presentadas en el Banco Mundial, la OMS y el UNICEF, 2012.

Retraso del crecimiento

Se considera que un niño menor de cinco años padece retraso del crecimiento cuando la estatura para su edad se encuentra dos desviaciones típicas por debajo de las normas sobre crecimiento infantil de la OMS de 2006.

Prevalencia de la anemia y las carencias de micronutrientes en los niños

Fuente: Iniciativa Micronutrientes, 2009.

Los valores en cursiva son estimaciones basadas en regresiones calculadas por la Iniciativa Micronutrientes. Se indica el valor 0,0* para los países que supuestamente no padecen carencia de vitamina A, pues su PIB per cápita es igual o superior a 15 000 USD.

Anemia

Se considera que los niños pequeños (menores de cinco años) padecen anemia cuando su nivel de hemoglobina es inferior a 110 gramos por litro.

Carencia de vitamina A

Los niños menores de cinco años presentan carencia de vitamina A cuando su concentración de retinol en suero es inferior a 0,70 µmol/litro o 20 µg/dl.

Carencia de yodo

Se considera que un niño padece carencia de yodo cuando su contenido de yodo en la orina es inferior a 100 µg/litro. Se entiende por niños aquellos cuya edad está comprendida entre los 6 y los 12 años.

Prevalencia de la obesidad en los adultos

Fuentes: OMS, 2013c y Naciones Unidas, 2011b. Las sumas regionales totales son estimaciones de la FAO basadas en la prevalencia de la obesidad presentada y los pesos de la población según la edad.

Obesidad

Se consideran obesos los adultos mayores de 20 años cuando su índice de masa corporal (IMC) es superior o igual a 30. El IMC se obtiene dividiendo el peso corporal en kilogramos por la altura en metros al cuadrado (kg/m2).

Cifras totales regionales y de grupos de países

En el cuadro figuran cifras totales regionales y de grupos de países para todos los indicadores; se trata de promedios ponderados que se calculan para las agrupaciones de países y regiones que se describen a continuación. En general, solo se comunican los promedios ponderados para grupos de países cuando los datos representan al menos dos tercios de la población disponible en esa clasificación.

Notas sobre países y regiones

Las agrupaciones regionales y subregionales, así como las designaciones de las regiones en desarrollo y desarrolladas, se indican con los códigos normalizados de países o zonas elaborados por la División de Estadística de la Naciones Unidas con fines estadísticos (disponible en: unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm). Los datos correspondientes a China excluyen los correspondientes a Hong Kong (Región Administrativa Especial de China) y Macao (Región Administrativa Especial de China). Los datos correspondientes al Sudán se refieren al antiguo Estado soberano del Sudán (integrado por el Sudán y Sudán del Sur).

CUADRO

CUADRO					
	Prevalencia del retraso del crecimiento infantil (Porcentaje)	Prevalencia de las carencias de micronutrientes y la anemia en niños (Porcentaje)			Prevalencia de la obesidad en los adultos (Porcentaje)
		Anemia	Carencia de vitamina	Carencia de yodo	
	Observación más reciente	Obse	ervación más rec	iente	2008
MUNDO	25,7	47,9	30,7	30,3	11,7
PAÍSES DE REGIONES EN DESARROLLO	28,0	52,4	34,0	29,6	8,7
árnica.	25.6	64.6	44.0	20.2	44.5
ÁFRICA	35,6	64,6	41,9	38,2	11,3
África subsahariana	39,6	67,8	45,6	36,0	7,5
África austral	30,8	27,1	18,7	28,3	31,3
Botswana	31,4	38,0	26,1	15,3	13,5
Lesotho	39,0	48,6	32,7	21,5	16,9
Namibia	29,6	40,5	17,5	28,7	10,9
Sudáfrica	23,9	24,1	16,9	29,0	33,5
Swazilandia	30,9	46,7	44,6	34,5	23,4
África central	35,0	63,9	56,1	23,8	4,8
Angola	29,2	29,7	64,3		7,2
Camerún	32,5	68,3	38,8	91,7	11,1
Chad	38,8	71,1	50,1	29,4	3,1
Congo	31,2	66,4	24,6		5,3
Gabón	26,3	44,5	16,9	38,3	15,0
Guinea Ecuatorial	35,0	40,8	13,9		11,5
República Centroafricana	40,7	84,2	68,2	79,5	3,7
República Democrática del Congo	43,4	70,6	61,1	10,1	1,9
Santo Tomé y Príncipe	31,6	36,7	95,6		11,3
África del Norte	21,0	46,6	20,4	49,3	23,0
Argelia	15,9	42,5	15,7	77,7	17,5
Egipto	30,7	29,9	11,9	31,2	34,6
Libia	21,0	33,9	8,0		30,8
Marruecos	14,9	31,5	40,4	63,0	17,3
Sáhara occidental					
Sudán	37,9	84,6	27,8	62,0	6,6
Túnez	9,0	21,7	14,6	26,4	23,8
África occidental	36,4	77,1	43,5	40,2	6,6
Benin	44,7	81,9	70,7	8,3	6,5
Burkina Faso	35,1	91,5	54,3	47,5	2,4
Cabo Verde	21,4	39,7	2,0	77,4	11,5

EL ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 2013

	Prevalencia del retraso del crecimiento infantil (Porcentaje)		e las carencias de r la anemia en niñ (Porcentaje)	Prevalencia de la obesidad en los adultos (Porcentaje)	
		Anemia	Carencia de vitamina	Carencia de yodo	
	Observación más reciente	Obs	servación más rec	iente	2008
Côte d'Ivoire	39,0	69,0	57,3	27,6	6,7
Gambia	24,4	79,4	64,0	72,8	8,5
Ghana	28,6	76,1	75,8	71,3	8,0
Guinea	40,0	79,0	45,8	32,4	4,7
Guinea-Bissau	32,2	74,9	54,7		5,4
Liberia	39,4	86,7	52,9	3,5	5,5
Malí	27,8	82,8	58,6	68,3	4,8
Mauritania	23,0	68,2	47,7	69,8	14,0
Níger	54,8	81,3	67,0	0,0	2,5
Nigeria	41,0	76,1	29,5	40,4	7,1
Santa Elena					
Senegal	28,7	70,1	37,0	75,7	8,0
Sierra Leona	37,4	83,2	74,8		7,0
Togo	29,5	52,4	35,0	6,2	4,6
África oriental	42,1	65,2	46,3	38,2	3,9
Burundi	57,7	56,0	27,9	60,5	3,3
Comoras	46,9	65,4	21,5		4,4
Djibouti	32,6	65,8	35,2		10,4
Eritrea	43,7	69,6	21,4	25,3	1,8
Etiopía	44,2	75,2	46,1	68,4	1,2
Kenya	35,2	69,0	84,4	36,8	4,7
Madagascar	49,2	68,3	42,1		1,7
Malawi	47,8	73,2	59,2		4,5
Mauricio	13,6	16,8	9,2	4,4	18,2
Mozambique	43,7	74,7	68,8	68,1	5,4
Reunión					
República Unida de Tanzanía	42,5	71,8	24,2	37,7	5,4
Rwanda	44,3	41,9	6,4	0,0	4,3
Seychelles	7,7	23,8	8,0		24,6
Somalia	42,1		61,7		5,3
Uganda	38,7	64,1	27,9	3,9	4,6
Zambia	45,8	52,9	54,1	72,0	4,2
Zimbabwe	32,3	19,3	35,8	14,8	8,6
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	13,4	38,5	15,7	8,7	23,4
América Central	18,6	29,6	22,3	10,1	30,4
Belice	22,2	35,9	11,7	26,7	34,9
Costa Rica	5,6	20,9	8,8	8,9	24,6

CUADRO (cont.)						
	Prevalencia del retraso del crecimiento infantil (Porcentaje)	del y la anemia en niños to (Porcentaje)			Prevalencia de la obesidad en los adultos (Porcentaje)	
		Anemia	Carencia de vitamina	Carencia de yodo		
	Observación más reciente	Obs	servación más rec	iente	2008	
El Salvador	20,6	18,4	14,6	4,6	26,9	
Guatemala	48,0	38,1	15,8	14,4	20,7	
Honduras	29,9	29,9	13,8	31,3	19,8	
México	15,5	29,4	26,8	8,5	32,8	
Nicaragua	23,0	17,0	3,1	0,0	24,2	
Panamá	19,1	36,0	9,4	8,6	25,8	
América del Sur	11,5	42,5	12,4	2,9	21,6	
Argentina	8,2	18,1	14,3		29,4	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	27,2	51,6	21,8	19,0	18,9	
Brasil	7,1	54,9	13,3	0,0	19,5	
Chile	2,0	24,4	7,9	0,2	29,1	
Colombia	12,7	27,7	5,9	6,4	18,1	
Ecuador	29,0	37,9	14,7	0,0	22,0	
Guayana francesa						
Guyana	19,5	47,9	4,1	26,9	16,9	
Paraguay	17,5	30,2	14,1	13,4	19,2	
Perú	19,5	50,4	14,9	10,4	16,5	
Suriname	10,7	25,7	18,0		25,8	
Uruguay	13,9	19,1	11,9		23,6	
Venezuela (República Bolivariana de)	13,4	33,1	9,4	0,0	30,8	
Caribe	6,7	41,3	17,8	59,8	20,3	
Anguila						
Antigua y Barbuda		49,4	7,4		25,8	
Antillas Neerlandesas			.,			
Aruba						
Bahamas		21,9	0,0*		35,0	
Barbados		17,1	6,5		33,4	
Cuba	7,0	26,7	3,6	51,0	20,5	
Dominica		34,4	4,2		25,0	
Granada		32,0	14,1		24,0	
Guadalupe						
Haití	29,7	65,3	32,0	58,9	8,4	
Islas Caimán						
Islas Turcas y Caicos						
Islas Vírgenes (EE.UU.)						
Islas Vírgenes Británicas						
Jamaica	5,7	48,2	29,4		24,6	
Martinica						

CUADRO (cont.)					
	Prevalencia del retraso del crecimiento infantil (Porcentaje)	Prevalencia de las carencias de micronutrientes y la anemia en niños (Porcentaje)			Prevalencia de la obesidad en los adultos (Porcentaje)
		Anemia	Carencia de vitamina	Carencia de yodo	
	Observación más reciente	Obs	ervación más reci	iente	2008
Montserrat					
Puerto Rico					
República Dominicana	 10,1	34,6	 13,7	86,0	21,9
Saint Kitts y Nevis		22,9	7,1		40,9
San Vicente y las Granadinas		32,3	2,1		25,1
Santa Lucía		32,2	11,3		22,3
Trinidad y Tabago	 5,3	30,4	7,2		30,0
inilidad y fabago	5,5	30,4	7,2		30,0
ASIA, CON EXCEPCIÓN DEL JAPÓN	26,8	49,6	33,9	29,8	6,0
Asia central	22,7 (A)	38,5	38,3	39,1	18,4
Kazajstán	17,5	36,3	27,1	53,1	24,4
Kirguistán	18,1	49,8	26,3	88,1	17,2
Tayikistán	39,2	37,7	26,8		9,9
Turkmenistán	28,1	35,8	28,0	18,7	14,3
Uzbekistán	19,6	38,1	53,1	39,8	17,3
Asia meridional	45,5 (A)	66,5	50,0	36,6	3,2
Afganistán	59,3	37,9	64,5	71,9	2,4
Bangladesh	43,2	47,0	21,7	42,5	1,1
Bhután	33,5	80,6	22,0	13,5	5,5
India	47,9	74,3	62,0	31,3	1,9
Irán (República Islámica del)	7,1	35,0	0,5	19,7	21,6
Maldivas	20,3	81,5	9,4	43,1	16,1
Nepal	40,5	78,0	32,3	27,4	1,5
Pakistán	43,0	50,9	12,5	63,6	5,9
Sri Lanka	19,2	29,9	35,3	30,0	5,0
Asia occidental	18,0	42,0	16,6	30,3	28,6
Arabia Saudita	9,3	33,1	3,6	23,0	35,2
Armenia	20,8	23,9	0,6	6,3	23,4
Azerbaiyán	26,8	31,8	32,1	74,4	24,7
Bahrein	13,6	24,7	0,0*	16,2	32,6
Chipre		18,6	0,0*		23,4
Emiratos Árabes Unidos		27,7	0,0*	56,6	33,7
Georgia	11,3	40,6	30,9	80,0	21,2
Iraq	27,5	55,9	29,8		29,4
Israel		11,8	0,0*		25,5
Jordania	8,3	28,3	15,1	24,4	34,3
Kuwait	3,8	32,4	0,0*	31,4	42,8

	Prevalencia del retraso del crecimiento infantil (Porcentaje)	lel y la anemia en niños o (Porcentaje)			Prevalencia de la obesidad en los adultos (Porcentaje)	
		Anemia	Carencia de vitamina	Carencia de yodo		
	Observación más reciente	Obs	servación más rec	iente	2008	
Líbano	16,5	28,3	11,0	55,5	28,2	
Omán	9,8	50,5	5,5	49,8	22,0	
Qatar	11,6	26,2	0,0*	30,0	33,1	
República Árabe Siria	27,5	41,0	12,1		31,6	
Territorio Palestino Ocupado			·		. ,.	
Turquía	12,3	32,6	12,4	60,9	29,3	
Yemen	57,7	68,3	27,0	30,2	16,7	
	,				,	
Asia oriental	8,5	20,1	9,4	15,0	5,6	
China	9,4	20,0	9,3	15,7	5,6	
Mongolia	27,5	21,4	19,8	52,8	16,4	
República de Corea		16,5	0,0*		7,3	
República Popular Democrática de Corea	32,4	31,7	27,5		3,8	
Asia sudoriental	27,4	41,0	23,4	30,2	5,3	
Brunei Darussalam		24,2	0,0*		7,9	
Camboya	40,9	63,4	22,3		2,3	
Filipinas	32,3	36,3	40,1	23,8	6,4	
Indonesia	35,6	44,5	19,6	16,3	4,7	
Malasia	17,2	32,4	3,5	57,0	14,1	
Myanmar	35,1	63,2	36,7	22,3	4,1	
República Democrática Popular Lao	47,6	48,2	44,7	26,9	3,0	
Singapur	4,4	18,9	0,0*		6,4	
Tailandia	15,7	25,2	15,7	34,9	8,5	
Timor-Leste	57,7	31,5	45,8		2,9	
Viet Nam	30,5	34,1	12,0	84,0	1,6	
OCEANÍA, CON EXCEPCIÓN DE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA	35,5	53,8	11,6	31,8	22,4	
Fiji	4,3	39,1	13,6	75,4	31,9	
Guam						
Islas Cook		24,7	10,4		64,1	
Islas Marianas septentrionales						
Islas Marshall		30,0	60,7		46,5	
Islas Salomón	32,8	51,7	13,1		32,1	
Islas Wallis y Futuna						
Kiribati	34,4	41,9	21,8		45,8	
Micronesia (Estados Federados de)		18,7	54,2		42,0	
Nauru	24,0	20,0	10,0		71,1	
Niue		21,6	15,5			

88

	Prevalencia del retraso del crecimiento infantil (Porcentaje)		e las carencias de 7 la anemia en niñ (Porcentaje)	Prevalencia de la obesidad en los adultos (Porcentaje)	
		Anemia	Carencia de vitamina	Carencia de yodo	
	Observación más reciente	Obs	servación más rec	iente	2008
Nueva Caledonia	"				
Palau		22,2	8,9		50,7
Papua Nueva Guinea	43,9	59,8	11,1	27,7	15,9
Polinesia Francesa					
Samoa	6,4	35,5	16,1		55,5
Samoa Americana					
Tokelau					
Tonga	2,2	27,6	17,0		59,6
Tuvalu	10,0	34,2	21,8		
Vanuatu	25,9	59,0	16,1		29,8
	,	,			
PAÍSES DE REGIONES DESARROLLADAS	7,2	11,8	3,9	37,7	22,2
ASIA Y OCEANÍA		10,1		49,6	7,8
Australia		8,0	0,0*	46,3	25,1
Japón		10,6	0,0*		4,5
Nueva Zelandia		11,3	0,0*	65,4	27,0
EUROPA		17,0	6,9	51,2	21,4
Europa meridional		15,8	4,0	47,3	20,5
Albania	23,1	31,0	18,6		21,1
Andorra		12,0	0,0*		24,2
Bosnia y Herzegovina	11,8	26,8	13,2	22,2	24,2
Croacia		23,4	9,2	28,8	21,3
Eslovenia		14,0	0,0*		27,0
España		12,9	0,0*	50,1	24,1
ex República Yugoslava de Macedonia	11,5	25,8	29,7	8,7	20,3
Gibraltar					
Grecia		12,1	0,0*		17,5
Italia		10,9	0,0*	55,7	17,2
Malta		16,3	4,0		26,6
Montenegro	7,9	29,5	17,2		21,8
Portugal	.,-	12,7	0,0*		21,6
San Marino		9,1	0,0*		
Santa Sede					
Serbia	6,6	29,5	17,2	20,8	23,0
	0,0	_5/5	- 7-	_ = 7,0	20,0
Europa occidental		8,2		43,8	18,5

	Prevalencia	Prevalencia de las carencias de micronutrientes			Prevalencia de la	
	del retraso del crecimiento infantil (Porcentaje)	y	, la anemia en niñ (Porcentaje)	os	obesidad en los adultos (Porcentaje)	
		Anemia	Carencia de vitamina	Carencia de yodo		
	Observación más reciente	Obs	servación más rec	iente	2008	
Austria		10,5	0,0*	49,4	18,3	
Bélgica		8,7	0,0*	66,9	19,1	
Francia		8,3	0,0*	60,4	15,6	
Liechtenstein						
Luxemburgo		9,4	0,0*	30,7	23,4	
Mónaco		5,0	0,0*			
Países Bajos		8,7	0,0*	37,5	16,2	
Suiza		6,3	0,0*	24,0	14,9	
		,,,	.,.	,	,-	
Europa oriental		26,0	14,9	57,5	23,3	
Belarús	4,5	27,4	17,4	80,9	23,4	
Bulgaria	8,8	26,7	18,3	6,9	21,4	
Eslovaquia		23,4	8,3	15,0	24,6	
Federación de Rusia		26,5	14,1	56,2	24,9	
Hungría		18,8	7,0	65,2	24,8	
Polonia		22,7	9,3	64,0	23,2	
República Checa	2,6	18,4	5,8	47,7	28,7	
República de Moldova	11,3	40,6	25,6	62,0	20,4	
Rumania	12,8	39,8	16,3	46,9	17,7	
Ucrania	3,7	22,2	23,8	70,1	20,1	
	,		•	,	,	
Europa septentrional		9,3	0,7	58,9	22,9	
Dinamarca		9,0	0,0*	70,8	16,2	
Estonia		23,4	8,7	67,0	18,9	
Finlandia		11,5	0,0*	35,5	19,9	
Irlanda		10,3	0,0*	60,8	24,5	
Islandia		7,8	0,0*	37,7	21,9	
Islas Feroe			· · ·			
Letonia		26,7	13,0	76,8	22,0	
Lituania		23,8	11,1	62,0	24,7	
Noruega		6,4	0,0*		19,8	
Reino Unido		8,0	0,0*		24,9	
Suecia		8,6	0,0*		16,6	
NORTEAMÉRICA		3,5		15,9	31,0	
Bermudas						
Canadá		7,6	0,0*		24,3	
Estados Unidos de América	3,9	3,1	0,0*	15,9	31,8	
Groenlandia						