

POISSONS OSSEUX

Acanthurus monroviae Steindachner, 1876

Noms FAO : An - Monrovia doctorfish; Es - Navajón; Fr - Chirurgien chas-chas.


Taille max.: 50 cm

Méth.capt. : pièges, filets fixes de fond, filets calés, chaluts et lignes.

Habitat : sur les fonds rocheux et coralliens de 0 à 60 m.

Noms loc. :

ACANTHURIDAE

***Prionurus biafraensis*** (Blache & Rossignol, 1961)

Synonymes : *Xesurus biafraensis* Blache & Rossignol, 1961.

Noms FAO : An - Biafra doctorfish; Es - Navajón de Biafra; Fr - Chirurgien biafra.


Taille max.: 20 cm, commune jusqu'à 15 cm.

Méth.capt. : filets maillants, chaluts de fond.

Habitat : démersale, eaux côtières.

Noms toc. :

2 bandes pâles sur la tête

***Albula vulpes*** (Linnaeus, 1758)

ALBULIDAE


Noms FAO : An - Bonefish; Es - Macabí; Fr - Banane de mer

Taille max. : 70 cm, commune jusqu'à 35 cm.

Méth.capt. : sennes coulissantes, sennes de plage.

Habitat : fréquente les fonds sableux et vaseux côtiers, les estuaires et les baies.

Noms loc. :

***Pterothrissus belloci*** Cadenat, 1937


Noms FAO : An - Longfin bonefish; Es - Macabí badejo; Fr - Banane gisu.

Taille max.: 45 cm environ.

Méth.capt.: chaluts de fond, filets calés.

Habitat : fréquente les fonds de 70 à 500 m; se rencontre plus communément sur la pente du talus continental.

Noms toc. :



POISSONS OSSEUX

ARIIDAE

Arius gigas Boulenger, 1911



Noms FAO : An - Giant sea catfish; Es - Bagre gigante; Fr - Mâchoiron géant.

Taille max. : plus de 120 cm.


Méth.capt. : engins artisanaux.

Habitat : connue seulement dans les cours d'eau se déversant dans la partie nord du golfe de Guinée. Probablement présente dans les cours d'eau, les estuaires et les eaux côtières autour des embouchures de rivières.

Noms loc. :



plaques dentaires sur la voûte de la bouche



vue dorsale de la tête

base du processus supra-occipital de largeur modérée

Arius heudeloti Valenciennes, 1840

Synonymes : *Arius mercatoris* Poll, 1946.



Noms FAO : An - Smoothmouth sea catfish; Es - Bagre bocalisa; Fr - Mâchoiron banderille.

Taille max. : 70 cm, commune jusqu'à 35 cm.


Méth.capt. : chaluts de fond, filets maillants de fond calés, sennes tournantes coulissantes, palangres.

Habitat : n'est connue que dans les affluents au nord du golfe de Guinée. Se trouve sans doute aussi dans les rivières, les estuaires et les eaux côtières autour des embouchures de rivières.

Noms loc. :



plaques dentaires sur la voûte de la bouche



vue dorsale de la tête

base du processus supra-occipital étroite

Arius latiscutatus Günther, 1864

Synonymes : *Arius gambensis* Cadenat, 1950; *Tachysurus gambensis* Fowler, 1936; *Tachysurus lagoensis* Fowler, 1936.



Noms FAO : An - Rough-head sea catfish; Es - Bagre de Gambia; Fr - Mâchoiron de Gambie.

Taille max. : environ 70 cm, commune jusqu'à 40 cm.


Méth.capt. : chaluts de fond, filets maillants de fond calés, sennes tournantes coulissantes.

Habitat : fréquente les eaux côtières et saumâtres, commune durant l'hivernage.

Noms loc. :



plaques dentaires sur la voûte de la bouche



vue dorsale de la tête

base du processus supraoccipital large

POISSONS OSSEUX

ARIIDAE

Arius parkii Günther, 1864

Synonymes : *Arius capellonis* Steindachner, 1867; *Arius heudeloti* [Boulenger, 1911] non Valenciennes, 1840); *Tachysurus capellonis* [Fowler, 1936]; *Tachysurus heudelotii* [Fowler, 1936]; *Arius granulatus* Peters, 1868.



Noms FAO : **An** - Guinean sea catfish; **Es** - Bagre de Guinea; **Fr** - Mâchoiron de Guinée.

Taille max. : 60 cm, commune jusqu'à 40 cm.


Méth.capt. : chaluts de fond, filets maillants calés, sennes coulissantes.

Habitat : habite les eaux côtières peu profondes et les estuaires, préfère les eaux saumâtres et marines.

Noms loc. :



plaques dentaires sur la voûte de la bouche



base du processus supraoccipital large et avec carène médiane

vue dorsale de la tête

Ariomma bondi Fowler, 1930

ARIOMMATIDAE

Synonymes : *Paracubiceps ledanoisi* Belloc, 1937; *Cubiceps nigriargenteus* Ginsburg, 1954; *Ariomma ledanoisi* (Belloc, 1937).


Noms FAO : **An** - Silver-rag drifffish; **Es** - Arioma lucia; **Fr** - Ariomme grise.

Taille max. : 30 cm, commune jusqu'à 20 cm.


Méth.capt.: chaluts de fond.

Habitat : fréquente les eaux profondes (100 à 300 m), de préférence sur les fonds vaseux.

Noms loc. :



vue dorsale de la tête



carènes charnues

écailles grandes, 30 à 45 sur la ligne latérale

Ariomma melanum (Ginsburg, 1954)

Synonymes : *Paracubiceps multisquamis* Marchal, 1961; *Ariomma multisquamis* (Marchal, 1961).


Noms FAO : **An** - Brown drifffish; **Es** - Arioma parda; **Fr** - Ariomme brune.

Taille max. : 25 cm, commune jusqu'à 20 cm.


Méth.capt.: chaluts de fond.

Habitat : eaux profondes, entre 200 et 600 m, généralement sur les fonds mous.

Noms loc. :



écailles petites, 50 à 65 sur la ligne latérale



vue dorsale de la tête

POISSONS OSSEUX

Aulopus cadenati Poll, 1953

AULOPODIDAE


Noms FAO : An - Guinean flagfin; Es - Lagarto real de Guinea; Fr - Limbert guinéen.

Taille max. : 27 cm, commune jusqu'à 26 cm.

Méth.capt. : chaluts.

Habitat : benthique sur le plateau continental externe et sur la partie supérieure du talus entre 100 et 270 m (16 à 14,5°C)

Noms toc. :

***Abalistes stellatus*** (Lacepède, 1798)

BALISTIDAE


Noms FAO : An - Starry triggerfish; Es - Pejepuerco estrellado; Fr - Baliste étoilé.

Taille max. : 60 cm.

Méth.capt. :

Habitat : fonds vaseux et sableux, jusqu'à 50 m.

Noms toc. :

***Balistes capriscus*** Gmelin, 1788

Synonymes : *Balistes carolinensis* Gmelin, 1788; *Balistes forcipatus* Gmelin, 1788.


Noms FAO : An - Grey triggerfish; Es - Pejepuerco blanco; Fr - Baliste cabri.

Taille max. : 50 cm environ, commune jusqu'à 20 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, pièges, lignes à main, sennes de plage

Habitat : fréquente les fonds sableux et rocheux jusqu'à 60 m.

Noms toc. :

***Balistes punctatus*** Gmelin, 1788

Synonymes : Souvent mal-identifié comme *Balistes forcipatus* Gmelin, 1788.

Noms FAO : An - Bluespotted triggerfish; Es - Pejepuerco moteado; Fr - Baliste à taches bleues.

Taille max. : environ 60 cm, commune jusqu'à 25 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, pièges, filets calés de fond, lignes à main, sennes de plage.

Habitat : fréquente les eaux côtières peu profondes et de préférence les zones sableuses; espèce solitaire.

Noms loc. :

