




POISSONS OSSEUX


CLUPEIDAE

Pellonula leonensis Boulenger, 1916**Synonymes** : *Microthrissa miri* Daget, 1954.**Noms FAO** : **An** - Guinean sprat; **Es** - Sardinita de Guinea; **Fr** - Spratelle de Guinée.**Taille max.** : 9 cm.**Méth.capt.** : sennes coulissantes (type "poli"), sennes de plage.**Habitat** : principalement en eaux douces, mais aussi dans les estuaires et lagunes à salinité moyenne. Se reproduit dans les rivières, les lacs et peut-être aussi dans les estuaires et lagunes.**Remarque** : une autre espèce, *Pellonula vorax* Günther, 1868, se rencontre souvent avec des jeunes *Sardinella maderensis* dans les estuaires et les lagunes. *P. vorax* possède des scutelles en avant des pectorales.**Noms loc.** :***Sardinella aurita*** Valenciennes, 1847**Synonymes** : *Alosa senegalensis* Bennett, 1831.**Noms FAO** : **An** - Round sardinella; **Es** - Alacha; **Fr** - Allache.**Taille max.** : 35 cm, commune jusqu'à 18cm.**Méth.capt.** : sennes coulissantes (type "poli"), filets maillants, sennes de plage, chaluts pélagiques.**Habitat** : fréquente les zones d'upwelling (eaux froides salées).

(voir planche IV, 25)

Noms loc. :***Sardinella maderensis*** (Lowe, 1839)**Synonymes** : *Pellonula modesta* Fischer, 1885; *Sardinella granigera* Valenciennes, 1847; *Sardinella eba* Valenciennes, 1847; *Sardinella cameronensis* Regan, 1917.**Noms FAO** : **An** - Madeiran sardinella; **Es** - Machuelo; **Fr** - Grande allache.**Taille max.** : 30 cm, commune jusqu'à 25 cm.**Méth.capt.** : filets tournants type "ringnet", sennes coulissantes (type "poli"), sennes de plage, éperviers, chaluts pélagiques.

(voir planche IV, 26)

Habitat : espèce côtière des eaux chaudes, présente de la surface jusqu'à 50 m, parfois rencontrée dans les estuaires et les lagunes.***Sardinella rouxi*** (Poll, 1953)**Synonyms** : *Harengula rouxi* Poll, 1953.**Noms FAO** : **An** - Yellowtail sardinella; **Es** - Alacha rabo amarillo; **Fr** - Sardinelle à queue jaune.**Taille max.** : 16 cm, commune jusqu'à 13 cm.**Méth.capt.** : sennes de plage, sennes coulissantes, filets maillants.**Habitat** : eaux côtières, plages, capturée souvent avec *S. maderensis*.**Noms loc.** :

POISSONS OSSEUX

***Coryphaena equiselis* Linnaeus, 1758**

Synonymes : *Coryphaena equisetis* Linnaeus, 1758.

Noms FAO : An - Pompano dolphinfish; Es - Dorado; Fr - Coryphène dauphin.


Taille max. : 75 cm, commune jusqu'à 50 cm.

Méth.capt. : palangres flottantes, sennes coulissantes, pêche à la traîne.


Habitat : espèce pélagique, se rencontre parfois dans les eaux côtières.

Remarques : une autre espèce, *C. hippurus* Linnaeus, 1758, a une plaque ovale de dents sur la langue, et de 52 à 59 rayons.

Noms loc. :



CORYPHAENIDAE

***Cynoglossus browni* Chabanaud, 1949**


Noms FAO : An - Nigerian tonguesole; Es - Lengua nigeriana; Fr - Langue nigériane.

Taille max. : 60 cm, commune jusqu'à 30 cm

Méth.capt. : chaluts de fond, sennes de plage.

Habitat : fréquente les eaux côtières et les fonds sablo-vaseux jusqu'à environ 30 m de profondeur.

Noms loc. :

***Cynoglossus cadenati* Chabanaud, 1947**


Noms FAO : An - Ghanian tonguesole; Es - Lengua de Ghana; Fr - Sole-langue du Ghana.

Taille max. : 20 cm commune jusqu'à 15 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, sennes de plage, filets calés de fond.

Habitat : habite les fonds vaseux et sableux des eaux côtières, à des profondeurs de 10 à 30 m.

Noms loc. :

***Cynoglossus canariensis* Steindachner, 1882**

Synonymes : *Cynoglossus lagoensis* Regan, 1915.


Noms FAO : An - Canary tonguesole; Es - Lengua de Canarias; Fr - Sole-langue canarienne.

Taille max. : 60 cm, commune jusqu'à 40 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, filets calés de fond.

Habitat : fréquente les fonds sableux et vaseux côtiers entre 15 et 300 m de profondeur.

Noms loc. :



POISSONS OSSEUX

CYNOGLOSSIDAE

Cynoglossus monodi Chabanaud, 1949


Noms FAO : An - Guinean tonguesole; Es - Lengua de Guinea; Fr - Sole-langue de Guinée.

Taille max. : au moins 40 cm, commune jusqu'à 30 cm

Méth.capt. : chaluts de fond, sennes de plage, filets calés de fond.

Habitat : fréquente les zones sablo-vaseuses côtières entre 10 et 25 m.

Noms loc. :



(voir planche IV, 27)

Cynoglossus senegalensis (Kaup, 1858)

Synonymes: *Cynoglossus goreensis* Steindachner, 1882.


Noms FAO : An - Senegalese tonguesole; Es - Lengua del Senegal; Fr - Sole-langue sénégalaise.

Taille max. : environ 40 cm, commune jusqu'à 25 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, sennes de plage, filets calés de fond.

Habitat : fréquente les zones sablo-vaseuses côtières entre 10 et 110 m.

Noms loc. :

***Symphurus ligulatus*** (Cocco, 1844)

Synonymes : ? *Symphurus vanmellae* Chabanaud, 1952.

Noms FAO : An - Elongate tonguesole; Es - Pelada tirrena; Fr - Plagusie longue.


Taille max. : 10 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond.

Habitat : fréquente les fonds vaseux du talus continental.

Remarques : d'après certains auteurs *S. vanmellae* constitue le stade métamorphosé de *S. ligulatus*.

Noms loc. :

***Symphurus nigrescens*** Rafinesque, 1810


Noms FAO : An - Spotted tonguesole; Es - Pelada; Fr - Plagusie sombre.

Taille max.: 12 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, dragues.

Habitat : vit sur des fonds vaseux ou sableux du talus et du plateau continentaux, entre 20 et 1140 m de profondeur.

Noms loc. :



POISSONS OSSEUX

Symphurus normani Chabanaud, 1950


Noms FAO : An - Norman's tonguesole, Es - Pelada de Norman; Fr - Plagusie de Norman.

Taille max. : 70 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, dragues.

Habitat : vit sur des fonds vaseux ou sableux du talus et du plateau continentaux, entre 20 et 1140 m de profondeur.

Noms loc. :

***Dactylopterus volitans*** (Linnaeus, 1758)

Synonymes : *Cephalacanthus volitans* (Linnaeus, 1758).


Noms FAO : An - Flying gurnard; Es - Alón; Fr - Poule de mer.

Taille max. : au moins 45 cm, commune jusqu'à 30 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, filets calés de fond, lignes.

Habitat : espèce démersale des fonds sableux et vaseux peu profonds.

Noms toc. :

***Diretmoides parini*** Post & Quéro, 1981


Noms FAO : An - Parin's spinyfin; Es - Malcarado de Parin; Fr - Drette de Parin.

Taille max. : 40 cm.

Méth.capt. : chaluts (prises secondaires).

Habitat : mésopélagique; jeunes près de la surface; les vieux adultes descendent souvent jusqu'en dessous de 1000 m.

Noms.loc. :

***Diretmoides pauciradiatus*** (Woods, 1973)

Noms FAO : An - Longwing spinyfin; Es - Malcarado alón; Fr - Drette aile longue.

Taille max. : 14 cm.

Méth.capt. : chaluts (prises secondaires).

Habitat : mésopélagique; jeunes près de la surface; les vieux adultes descendent souvent jusqu'à en dessous de 1000 m.

Noms loc. :

