

POISSONS OSSEUX

DIRETMIDAE

Diretmus argenteus Johnson, 1863


Noms FAO : An - Silver spinyfin; Es - Malcarado plateado; Fr - Dirette argentée.

Taille max. : 15 cm.

Méth.capt. : chaluts (prises secondaires).

Habitat : mésopélagique; jeunes près de la surface à environ 250 m de profondeur; les adultes vivent surtout à une profondeur allant de 500 à 700 m.

Noms loc. :



DREPANIDAE

Drepane africana Osorio, 1892

Noms FAO : An - African sicklefish; Es - Catemo africano; Fr - Forgeron ailé.


Taille max. : 40 cm, commune jusqu'à 35 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, sennes de plage, sennes coulissantes.

Habitat : fréquente les fonds sablo-vaseux entre 20 et 50 m.

Noms loc. :

environ 8 bandes étroites sombres souvent présentes sur les côtés



(voir planche IV, 28)

ELOPIDAE

Elops lacerta Valenciennes, 1846


Noms FAO : An - West African ladyfish; Es - Malacho copace; Fr - Guinée copace.

Taille max. : 90 cm, commune jusqu'à 60 cm.

Méth.capt. : sennes coulissantes, sennes de plage, filets tournants maillants.

Habitat : fréquente les eaux côtières peu profondes durant la saison chaude, et les estuaires pendant toute l'année.

Noms loc. :



(voir planche IV, 30)

POISSONS OSSEUX

Elops senegalensis Regan, 1909

ELOPIDAE


Noms FAO : An - Senegalese ladyfish; Es - Malacho senegalés; Fr - Guinée du Sénégal.

Taille max. : 90 cm, commune jusqu'à 60 cm.

Méth.capt. : sennes de plage, sennes coulissantes et chaluts de fond.

Habitat : eaux côtières peu profondes en saison chaude; estuaires et lagunes durant toute l'année.

Noms loc. :

***Erythrocles monodi*** Poll & Cadenat, 1954

EMMELICHTHYIDAE


Noms FAO : An - Atlantic rubyfish; Es - Pez rubí; Fr - Poisson rubis.

Taille max. : 55 cm, commune jusqu'à 35 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond.

Habitat : fréquente des fonds de 100 à 300 m sur le plateau continental.

Noms loc. :

***Engraulis encrasicolus*** (Linnaeus, 1758)

ENGRAULIDAE

Synonymes : *Anchoa guineensis* Rossignol & Blache, 1961; *Engraulis guineensis* (Rassignol & Blache, 1961).


Noms FAO : An - European anchovy; Es - Anchoa europea; Fr - Anchois commun.

Taille max. : 14 cm, commune jusqu'à 7 cm.

Méth.capt. : sennes coulissantes (type "poli"), sennes de plage.

Habitat : espèce pélagique côtière, fréquente parfois des profondeurs de 400 m (eaux froides).

Noms loc. :

***Chaetodipterus goreensis*** (Cuvier, 1831)

EPHIPPIDAE

Synonymes : *Ephippus goreensis* Cuvier, 1831.


Noms FAO : An - African spadefish; Es - Paguala africana; Fr - Chèvre de mer.

Taille max. : 30 cm, commune jusqu'à 25 cm.

Méth.capt. : filets calés, sennes, chaluts.

Habitat : fréquente les zones sablo-vaseuses des estuaires.

Noms loc. :



POISSONS OSSEUX

EHIPPIDIDAE

Chaetodipterus lippei Steindachner, 1895

Synonymes : souvent confondue avec *Chaetodipterus goreensis* (Cuvier, 1831).

Noms FAO : **An** - West African spadefish; **Es** - Paguala negra; **Fr** - Chèvre de mer noire.


Taille max. : 30 cm, commune jusqu'à 20 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, sennes de plage.

Habitat : sur fonds sablo-vaseux dans les eaux côtières, entre 10 et 145 m de profondeur.

Noms loc. :

seule 3e épine allongée

***Cypselurus cyanopterus*** (Valenciennes, 1846)

EXOCOETIDAE

Synonymes : *Cheilopogon cyanopterus* (Valenciennes, 1846).

Noms FAO : **An** - Margined flyfish; **Es** - Volador bordiblanco; **Fr** - Exocet codène.

Taille max. : 35 cm (longueur standard).


Méth.capt. : sennes coulissantes, filets dérivants, chaluts pélagiques.

Habitat : espèce pélagique dans les eaux côtières.

Noms loc. :

33-41 écailles prédorsales

tache noire triangulaire

***Cypselurus melanurus*** (Valenciennes, 1846)

Synonymes : *Cypselurus lutkeni* (Jordan & Meek, 1896).

Noms FAO : **An** - Atlantic flyingfish; **Es** - Volador atlántico; **Fr** - Exocet atlantique.


Taille max. : 26 cm (longueur standard).

Méth.capt. : sennes coulissantes, filets dérivants, chaluts pélagiques.

Habitat : pélagique, surtout dans les eaux côtières de surface.

Noms loc. :

27-35 écailles prédorsales

***Cypselurus milleri*** Gibbs & Staiger, 1970

Noms FAO : **An** - Guinean flyingfish; **Es** - Volador de Guinea; **Fr** - Exocet de Guinée.


Taille max. : 28 cm (longueur standard).

Méth.capt. : sennes coulissantes, filets dérivants, chaluts pélagiques.

Habitat : pélagique dans les eaux océaniques et côtières de surface.

Noms loc. :

36-45 écailles prédorsales



POISSONS OSSEUX

Cypselurus nigricans (Bennett, 1840)

Synonyms : confondue avec *Cypselurus exsiliens* (Linnaeus, 1771) avant 1970; *Cheilopogon nigricans* (Bennett, 1840)


Noms FAO : **An** - African flyingfish; **Es** - Volador africano; **Fr** - Exocet africain.

Taille max.: 28 cm (longueur standard).

Méth.capt.: sennes coulissantes, chaluts pélagiques, filets dérivants.

Habitat : pélagique dans les eaux océaniques de surface

Noms loc. :

***Cypselurus pinnatibarbus*** (Bennett, 1831)

Synonymes : *Cypselurus lineatus* (Valenciennes, 1846).


Noms FAO : **An** - Bennett's flyingfish; **Es** - Volador de Bennett; **Fr** - Exocet de Bennett.

Taille max.: 40 cm (longueur standard).

Méth.capt. : sennes coulissantes, filets dérivants, chaluts pélagiques.

Habitat : pélagique dans les eaux côtières de surface.

Noms loc. :

***Exocoetus obtusirostris*** Günther, 1866

Noms FAO : **An** - Oceanic two-wing flyingfish; **Es** - Volador fiato; **Fr** - Exocet bouledogue.


Taille max.: 19 (longueur standard).

Méth.capt. : sennes coulissantes, filets dérivants, chaluts pélagiques.

Habitat : pélagique dans les eaux de surface.

Remarques : présence dans le golfe de Guinée à confirmer.

Noms loc. :

***Exocoetus volitans*** Linnaeus, 1758

Noms FAO : **An** - Tropical two-wing flyingfish; **Es** - Volador; **Fr** - Exocet volant.


Taille max.: 25 cm (longueur standard).

Méth.capt. : sennes coulissantes, filets dérivants, chaluts pélagiques.

Habitat : pélagique dans les eaux de surface.

Remarques : présence dans le golfe de Guinée à confirmer.

Noms loc. :



POISSONS OSSEUX

EXOCOETIDAE

Fodiator acutus (Valenciennes, 1846)


Noms FAO : An - Sharpchin flyingfish; Es - Volador picudo; Fr - Exocet bécune.

Taille max. : 15 cm.

Méth.capt. : sennes coulissantes, filets dérivants, chaluts pélagiques.

Habitat : pélagique dans les eaux de surface.

Noms loc. :

***Hirundichthys affinis*** (Günther, 1866)


Noms FAO : An - Fourwing flyingfish; Es - Volador golondrina; Fr - Exocet hirondelle.

Taille max. : 25 cm (longueur standard).

Méth.capt. : sennes coulissantes, filets dérivants, chaluts pélagiques.

Habitat : pélagique dans les eaux de surface près des côtes.

Noms loc. :

***Hirundichthys speculiger*** (Valenciennes, 1846)

Noms FAO : An - Mirrorwing flyingfish; Es - Volador espejo; Fr - Exocet miroir.


Taille max. : 25 cm (longueur standard).

Méth.capt. : sennes coulissantes, filets dérivants, chaluts pélagiques.

Habitat : pélagique dans les eaux de surface côtières.

Remarques : présence dans le golfe de Guinée à confirmer.

Noms loc. :

***Parexocoetus brachypterus*** (Richardson, 1846)

Noms FAO : An - Sailfin flyingfish; Es - Volador aletón; Fr - Exocet voilier.

Taille max. : 16 cm (longueur standard).

Méth.capt. : sennes coulissantes, filets dérivants, chaluts pélagiques.

Habitat : pélagique dans les eaux de surface.

Noms loc. :

