

POISSONS OSSEUX

HEMIRAMPHIDAE

***Euleptorhampus velox* Poey, 1868**


Noms FAO : An - Flying halfbeak; Es - Agujeta voladora; Fr - Demi-bec volant.

Taille max. : commune jusqu'à 35 cm.

Méth.capt. : chaluts pélagiques, sennes de plage, sennes coulissantes.

Habitat : espèce pélagique habitant les eaux côtières et océaniques.

Noms loc. :

***Hemiramphus balao* Le Sueur, 1825**


Noms FAO : An - Balao halfbeak; Es - Agujeta balajú; Fr - Demi-bec balaou.

Taille max. : au moins 40 cm.

Méth.capt. : chaluts pélagiques, sennes de plage, sennes coulissantes.

Habitat : espèce côtière vivant en surface, formant des bancs importants.

Noms loc. :

***Hemiramphus brasiliensis* (Linneaus, 1758)**


Noms FAO : An - Ballyhoo halfbeak; Es - Agujeta brasileña; Fr - Demi-bec brésilien.

Taille max. : 55 cm, commune jusqu'à 30 cm.

Méth.capt. : chaluts pélagiques, sennes de plage, sennes coulissantes, filets calés, lignes.

Habitat : espèce pélagique côtière vivant en bancs.

Noms loc. :



(voir planche VI, 41)

***Hyporhamphus picarti* (Valenciennes, 1846)**

Synonymes : *Hyporamphus unifasciatus* (non Ranzani, 1842) [Fowler, 1936].


Noms FAO : An - African halfbeak; Es - Agujeta africana; Fr - Demi-bec africain.

Taille max. : 18 cm, commune jusqu'à 10 cm.

Méth.capt. : chaluts pélagiques, sennes de plage, sennes coulissantes, filets calés.

Habitat : espèce pélagique côtière formant des bancs; pénétrant fréquemment dans les estuaires.

Noms loc. :



POISSONS OSSEUX

Oxyporhamphus micropterus similis (Bruun, 1935)

HEMIRAMPHIDAE


Noms FAO : An - False halfbeak; Es - Falsa agujeta; Fr - Faux demi-bec.

Tail le max. : 18 cm (longueur standard).

Méth.capt. : sennes coulissantes, filets dérivants.

Habitat : espèce pélagique habitant les eaux côtières.

Noms loc. :

***Holocentrus ascensionis*** (Osbeck, 1765)

HOLOCENTRIDAE

Noms FAO : An - Squirrelfish; Es - Candil gallito; Fr - Marignan coq.


Taille max. : au moins 34,5 cm (longueur standard).

Méth.capt.: pièges, filets calés, chaluts.

Habitat : sur les récifs coralliens peu profonds ainsi que dans les eaux plus profondes du large jusqu'à 90 m. Espèce nocturne.

Noms loc. :

Remarques: présence dans le golfe de Guinée à confirmer.

***Myripristis jacobus*** Cuvier, 1829


Noms FAO : An - Blackbar soldierfish; Es - Candil colorado; Fr - Marignan mombin.

Taille max. : 21,6 cm.

Méth.capt. : pièges, filets calés, chaluts.

Habitat : trouvée sur les récifs coralliens peu profonds et les eaux du large à des profondeurs de 90 m environ. Espèce nocturne.

Noms loc. :

***Sargocentron hastatus*** (Valenciennes, 1829)

Synonymes : *Adioryx hastatus* (Valenciennes, 1829), *Holocentrus hastatus* Valenciennes, 1829.


Noms FAO : An - Red squirrelfish; Es - Candil africano; Fr - Marignan rouge.

Taille max. : 46 cm, commune jusqu'à 25 cm.

Méth.capt. : pièges, filets calés, chaluts.

Habitat : fréquente les zones rocheuses et coralliennes de 0 à 200 m.

Noms loc. :



(voir planche VI, 42)

POISSONS OSSEUX

Istiophorus albicans (Latreille, 1804)

Synonymes : *Histiophorus albicans* (Latreille, 1804); *Histiophorus americanus* Cuvier, 1832; *Makaira albicans* Latreille, 1804.

Noms FAO : **An** - Atlantic sailfish; **Es** - Pez vela del Atlántico; **Fr** - Voilier de l'Atlantique.


Taille max. : environ 300 cm, commune jusqu'à 200 cm.

Méth.capt. : palangres de surface, pêche à la traîne, filets dérivants.

Habitat : espèce pélagique des eaux de surface, très migratrice durant l'hivernage.

Noms loc. :

ISTIOPHORIDAE

***Makaira indica*** (Cuvier, 1832)

Synonymes : *Makaira marlina* Jordan & Hill, 1926; *Istiompax marlina* (Jordan & Hill, 1926); *Istiompax indicus* (Cuvier, 1832).


Noms FAO : **An** - Black marlin; **Es** - Aguja negra; **Fr** - Makaïre noir.

Taille max. : jusqu'à 460 cm, commune jusqu'à 300 cm.

Méth.capt. : palangres de surface, pêche à la traîne, filets dérivants.

Habitat : pélagique généralement au-dessus de la thermocline se déplaçant souvent vers la côte, mais surtout océanique et hautement migratrice.

Noms loc. :

***Makaira nigricans*** Lacepède, 1802

Synonymes : *Makaira ampia* (Poey, 1860).


Noms FAO : **An** - Blue marlin; **Es** - Aguja azul; **Fr** - Makaïre bleu.

Taille max. : jusqu'à 400 cm, commune jusqu'à 300 cm.

Méth.capt. : palangres de surface, pêche à la traîne, filets dérivants.

Habitat : pélagique et océanique, hautement migratrice, trouvée généralement au-dessus de la thermocline.

Noms loc. :

***Tetrapturus albidus*** Poey, 1860

Synonymes : *Makaira albida* (Poey, 1860); *Lamontella albida* (Poey, 1860).


Noms FAO : **An** - White marlin; **Es** - Aguja blanca; **Fr** - Makaïre blanc.

Taille-max. : jusqu'à 300 cm, commune jusqu'à 200 cm.

Méth.capt. : palangres de surface, pêche à la traîne, filets dérivants,

Habitat : pélagique généralement au-dessus de la thermocline.

Noms loc. :



POISSONS OSSEUX

Tetrapturus pfluegeri Robins & de Sylva, 1963

ISTIOPHORIDAE


Synonymes : *Tetrapturus belone* (non Rafinesque, 1810) [Fowler, 1936].

Noms FAO : **An** - Longbill spearfish; **Es** - Aguja picuda; **Fr** - Makaïre bécune.

Taille max. : 200 cm, commune jusqu'à 180 cm (longueur standard).

Méth.capt. : palangres, filets dérivants.

Habitat : pélagique et océanique; hautement migratrice, trouvée généralement au-dessus de la thermocline.



Parakuhlia macrophthalmus (Osorio, 1894)

KUHLIIDAE


Noms FAO : **An** - Dara; **Es** - Dara; **Fr** - Crocro à gros yeux.

Taille max. : 15 cm, commune jusqu'à 10 cm.

Méth.capt. : sennes de plage, filets calés, lignes.

Habitat : espèce très côtière, sur fonds rocheux et sableux, jusqu'à environ 30 m. Présente durant toute l'année.

Noms loc. :



Kyphosus incisor (Cuvier, 1831)

KYPHOSIDAE

Noms FAO : **An** - Yellow sea chub; **Es** - Chopa amarilla; **Fr** - Calicagère jaune.


Taille max. : 67 cm, commune jusqu'à 45 cm.

Méth.capt. : filets calés, lignes.

Habitat : eaux côtières peu profondes, sur les fonds rocheux.

Remarques : présence dans le golfe de Guinée à confirmer.

Noms loc. :



Kyphosus sectatrix (Linnaeus, 1758)


Noms FAO : **An** - Bermuda sea chub; **Es** - Chopa blanca; **Fr** - Calicagère blanche.

Taille max. : 76 cm, commune jusqu'à 50 cm.

Méth.capt. : filets calés, lignes.

Habitat : eaux côtières peu profondes.

Noms loc. :



POISSONS OSSEUX

LABRIDAE

Acantholabrus palloni (Rissa, 1810)


Noms FAO : An - Scaled-rayed wrasse; Es - Tae rocas; Fr - Roucaou.

Taille max. : 30 cm, commune jusqu'à 25 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond.

Habitat : eaux côtières près des fonds rocheux ou sableux, de 30 à 500 m de profondeur; espèce solitaire.

Noms loc. :

***Bodianus scrofa*** (Valenciennes, 1839)


Noms FAO : An - Barred hogfish; Es - Vieja; Fr - Pourceau.

Taille max. : 43 cm, commune jusqu'à 30 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, lignes.

Habitat : préfère les fonds rocheux dans des eaux de profondeur modérée (20 à 100 m).

Noms loc. :

***Bodianus speciosus*** (Bowdich, 1825)

Synonymes : Diastodon speciosus Bowdich, 1825.


Noms FAO : An - Blackbar hogfish; Es - Vieja lomonegro; Fr - Pourceau dos noir.

Taille max. : 50 cm, commune jusqu'à 40 cm.

Méth.capt. : lignes, chaluts de fond, filets calés de fond.

Habitat : Fréquente les zones rocheuses et coralliennes de 3 à 70 m. Présente toute l'année. Pêchée surtout durant la saison chaude.

Noms loc. : LÉBOU: Tiathieu; OUOLOF: Dienou gewel, Demba série.



(voir planche VI, 43)

Coris julis (Linnaeus, 1758)


Noms FAO : An - Rainbow wrasse; Es - Doncella julia; Fr - Girelle.

Taille max. : 30 cm, commune entre 18 et 25 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, filets calés de fond, lignes.

Habitat : Plus communément dans les zones rocheuses peu profondes et le long des bords des herbiers marins (profondeur de 1 à 120 m).

Noms loc. :



(voir planche VI, 44)