

## POISSONS OSSEUX

LABRIDAE

***Thalassoma pavo*** (Linnaeus, 1758)


**Noms FAO :** An - Ornate wrasse; Es - Fredi; Fr - Girelle paon

**Taille max. :** 25 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond, sennes de plage, lignes.

**Habitat :** eaux côtières près des rochers et des herbiers, de 1 à 150 m, le plus souvent à moins de 50 m, en solitaire ou en petits groupes.

**Noms loc. :**

***Xyrichthys novacula*** (Linnaeus, 1758)

**Synonymes :** *Xyrichthys psittacus* (Linnaeus, 1758); *Hemipteronotus novacula* [Randall, 1965].


**Noms FAO :** An - Pearly razorfish; Es - Doncella cuchilla; Fr - Donzelle lame.

**Taille max. :** 26 cm, commune jusqu'à 20 cm.

**Méth.capt. :** lignes, chaluts de fond.

**Habitat :** Régions à eaux claires sur fonds de sable, souvent associées à des taches d'herbe ou de débris coralliens.

**Noms loc. :**

***Lampris guttatus*** (Brünnich, 1788)

**Synonymes :** *Lampris regius* (Bonnaterre, 1788); *Lampris luna* (Gmelin, 1789).

**Noms FAO :** An - Opah; Es - Opa; Fr - Opah.


**Taille max. :** au moins 185 cm, commune jusqu'à 120 cm.

**Méth.capt. :** palangres flottantes, sennes coulissantes.

**Habitat :** de la surface à une profondeur d'environ 200 m; vit dans les eaux tempérées, mais migre vers le nord durant les mois chauds.

**Noms loc. :**

corps rose à violet avec taches blanches; toutes les nageoires rouge écarlate



LAMPRIDAE

***Lethrinus atlanticus*** Valenciennes, 1830


**Noms FAO :** An - Atlantic emperor; Es - Emperador atlántico; Fr - Empereur atlantique.

**Taille max. :** 50 cm, commune jusqu'à 25 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond, sennes de plage, sennes coulissantes, lignes.

**Habitat :** fréquente les eaux côtières jusqu'à 50 m, abondante pendant la saison de l'hivernage.

**Noms loc. :**



LETHRINIDAE

## POISSONS OSSEUX

## LOBOTIDAE

***Lobotes surinamensis*** (Bloch, 1790)


**Noms FAO :** An - Atlantic tripletail; Es - Dormilona; Fr - Croupi a roche.

**Taille max. :** 100 cm, commune jusqu'à 50 cm.

**Méth.capt. :** sennes coulissantes,, filets maillants calés, lignes.

**Habitat :** pélagique, flotte souvent sur le côté, près de la surface.

**Noms loc. :**



(voir planche VI, 45)

***Lophiodes kemp*** (Norman, 1935)

**Synonymes :** *Chirolophius kemp* Norman, 1935.


**Noms FAO :** An - Longspine African angler; Es - Rape espinoso; Fr - Baudroie épineuse.

**Taille max. :** 30 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond.

**Habitat :** benthique, entre 50 et 400 m de profondeur.

**Noms loc. :**



vue latérale (*Lophiodes*)

***Lophius vaillant*** Regan, 1903


**Noms FAO :** An - Shortspine African anglerfish; Es - Rape africano; Fr - Baudroie africaine.

**Taille max. :** 50 cm, commune jusqu'à 40 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond.

**Habitat :** exclusivement démersale entre 200 et 300 m de profondeur.

**Noms loc. :**



vue latérale (*Lophius*)

## POISSONS OSSEUX

***Apsilus fuscus*** Valenciennes, 1830

**Noms FAO :** An - African forktail snapper; Es - Pargo tijera; Fr - Vivaneau fourche (d'Afrique).


**Taille max. :** 50 cm, commune jusqu'à 35 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond, lignes à main, filets calés

**Habitat :** Fréquente les fonds rocheux et coralliens entre 15 et 100 m.

**Noms loc. :**

LUTJANIDAE



***Lutjanus agennes*** Bleeker, 1863

**Noms FAO :** An - African red snapper; Es - Pargo colorado africano; Fr - Vivaneau africain rouge.


**Taille max. :** au moins 75 cm, commune jusqu'à 40 cm.

**Méth.capt. :** palangres, lignes à main, filets calés de fond, chaluts de fond.


**Habitat :** fréquente les fonds rocheux, pénètre parfois dans les estuaires et les lagunes.

**Noms loc. :**

4 rangées d'écaillles horizontales, sauf sur le pédoncule caudal



(voir planche VI, 47)



***Lutjanus dentatus*** (Duméril, 1860)

**Noms FAO :** An - African brown snapper; Es - Pargo marrón africano; Fr - Vivaneau brun (d'Afrique).


**Taille max. :** 90 cm, commune jusqu'à 75 cm.

**Méth.capt. :** lignes à main, palangres, filets calés de fond, chaluts de fond.


**Habitat :** fréquente les fonds rocheux, se rencontre aussi dans les estuaires.

**Noms loc. :**

rangées d'écaillles dirigées vers le haut



9 ou 10 rangées d'écaillles



***Lutjanus endecacanthus*** Bleeker, 1863

**Noms FAO :** An - Guinea snapper; Es - Pargo de Guinea; Fr - Vivaneau de Guinée.


**Taille max. :** 20 cm

**Méth.capt. :** lignes à main, filets calés de fond.


**Habitat :** Fonds rocheux et récifs coralliens, aussi dans les lagunes saumâtres et parfois dans les rivières.

**Noms loc. :**

6 rangées d'écaillles



coloration: brun à brun foncé



## POISSONS OSSEUX

***Lutjanus fulgens*** (Valenciennes, 1830)

LUTJANIDAE


**Noms FAO :** An - Golden African snapper; Es - Pargo dorado africano; Fr - Vivaneau doré.

**Taille max. :** 40 cm, commune jusqu'à 25 cm.

**Méth.capt. :** lignes à main, chaluts de fond.

**Habitat :** fréquente les fonds rocheux à une profondeur moyenne de 60 m.

**Noms loc. :**



(voir planche VII, 49)

***Lutjanus goreensis*** (Valenciennes, 1830)


**Noms FAO :** An - Gorean snapper; Es - Pargo de Gorea; Fr - Vivaneau de Gorée.

**Taille max. :** 80 cm, commune jusqu'à 50 cm.

**Méth.capt. :** lignes à main, palangres, filets calés de fond, chaluts de fond.

**Habitat :** fréquente les fonds durs et rocheux, les juvéniles se rencontrent dans les estuaires.

**Noms loc. :**



(voir planche VII, 50)

***Macroramphosus scolopax*** (Linnaeus, 1758)

MACRORAMPHOSIDAE

**Synonymes :** *Macroramphosus gracilis* (Lowe, 1839).


**Noms FAO :** An - Longspine snipefish; Es - Trompetero; Fr - Bécasse de mer.

**Taille max. :** 20 cm, commune jusqu'à 14 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond.

**Habitat :** démersale à environ 500 m de profondeur; vit en bancs; les juvéniles vivent dans les eaux de surface océaniques.

**Noms loc. :**

***Coelorinchus coelorhynchus*** (Risso, 1810)

MACROURIDAE

**Synonymes :** *Coelorhynchus coelorhynchus* (Risso, 1810); *Coelorhynchus laville* Risso, 1809.

**Noms FAO :** An - Hollowsnout grenadier; Es - Granadero acorazado (= Ratón); Fr - Grenadier raton.

**Taille max. :** 38 cm, commune jusqu'à 30 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond.

**Habitat :** à des profondeurs de 140 à 630 m.

**Noms loc. :**

