

POISSONS OSSEUX

MACROURIDAE

Malacocephalus laevis (Lowe, 1843)


Noms FAO : An - Softhead grenadier; Es - Abámbolo de bajura; Fr- Grenadier barbu.

Taille max. : 55 cm environ, commune jusqu'à 30 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond.

Habitat : poissons des plateaux continentaux supérieurs, de 250 à 750 m de profondeur.

Noms loc. :

***Malacocephalus occidentalis*** Goode & Bean, 1885

Synonymes : *Ventrifossa occidentalis* (Goode & Bean, 1885); *Macruoplus violaceus* (non sensu Zugmayer, 1911).


Noms FAO : An - Western softhead grenadier; Es - Abámbolo; Fr - Grenadier scie.

Taille max. : 45 cm, commune jusqu'à 30 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond.

Habitat : dans les eaux tropicales à tempérées du talus continental, de 140 à 580 m de profondeur.

Noms loc. :

***Nezumia aequalis*** (Günther, 1878)


Noms FAO : An - Smooth grenadier; Es - Grenadero liso; Fr - Grenadier lisse.

Taille max. : 30 cm, commune jusqu'à 25 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond.

Habitat : commune aux profondeurs de 200 à 1000 m.

Noms loc. :

***Tarpon atlanticus*** (Valenciennes, 1846)

Synonymes : *Megalops atlanticus* Valenciennes, 1846.

Noms FAO : An - Atlantic tarpon; Es - Tarpon; Fr - Tarpon argenté.


Taille max. : 250 cm, commune jusqu'à 130 cm.

Méth.capt. : sennes coulissantes, sennes de plage, éperviers, lignes.

Habitat : pélagique, les jeunes fréquentent les eaux saumâtres et douces peu profondes.

Noms loc. :

MEGALOPIDAE



POISSONS OSSEUX

MERLUCCIIDAE

Merluccius polli Cadenat, 1950

Synonymes : ? *Merluccius cadenati* Doutré, 1960.


Noms FAO : An - Benguela hake; Es - Merluza de Benguela; Fr - Merlu d'Afrique tropicale.

Taille max. : 90 cm, commune jusqu'à 65 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond.

Habitat : démersale de 150 à 600 m de profondeur.

Noms loc. :

***Psettias sebae*** (Cuvier, 1831)

Synonymes : *Psettus sebae* (Cuvier, 1831).


Noms FAO : An - African moony; Es - Rambalí; Fr - Breton africain.

Taille max. : 25 cm, commune jusqu'à 15 cm.

Méth.capt. : éperviers, filets maillants calés.

Habitat : cette espèce fréquente essentiellement les estuaires et les mangroves.

Noms toc. :

***Antimora rostrata*** (Günther, 1878)

MORIDAE

Synonymes : *Antimora australis* Barnard, 1925.


Noms FAO : An - Blue antimora; Es - Mollera azul; Fr - Antimore bleu.

Taille max. : au moins 60 cm.

Méth.capt. : chaluts, palangres de fond calées.

Habitat : benthopélagique, entre 350 et 3000 m de profondeur.

Noms loc. :

***Gadella imberbis*** (Vaillant, 1888)

Synonymes : *Brosmiculus imberbis* Vaillant, 1888.


Noms FAO : An - Beardless codling; Es - Gadela imberbe; Fr - Gadelle imberbe.

Taille max. : 23 cm, commune jusqu'à 18 cm.

Méth.capt. : comme prises secondaires avec chaluts crevettiers d'eau profonde.



Habitat : benthopélagique, sur le talus continental supérieur.

Noms loc. :





POISSONS OSSEUX

MORIDAE

Laemonema laureysi Poll, 1953**Noms FAO :** An - Guinean codling; Es - Lemonema de Guinée; Fr - Lémonème de Guinée.**Taille max. :** 30 cm.**Méth.capt. :** chaluts.**Habitat :** benthopélagique, à des profondeurs entre 220 et 500 m.**Noms loc. :*****Liza dumerilii*** (Steindachner, 1870)**Synonymes :** *Mugil hoefleri* Steindachner, 1882; *Mugil canaliculatus* Smith, 1935.**Noms FAO** An - Grooved mullet; Es - Liza acanalada; Fr - Mulet bouri.**Taille max. :** 35 cm, commune jusqu'à 25 cm.**Méth.capt. :** chaluts de fond, sennes de plage, trémails, lignes.**Habitat :** fréquente les eaux côtières et les estuaires.**Noms loc. :**

MUGILIDAE

Liza falcipinnis (Valenciennes, 1836)**Noms FAO :** An - Sicklefin mullet; Es - Liza aletona; Fr - Mulet à grandes nageoires.**Taille max. :** jusqu'à 35 cm, commune jusqu'à 25 cm.**Méth.capt. :** chaluts de fond, sennes de plage, trémails, lignes.**Habitat :** eaux côtières et saumâtres.**Noms toc. :*****Liza grandisquamis*** (Valenciennes, 1836)**Noms FAO :** An - Largescaled mullet; Es - Liza escamuda; Fr - Mulet écailleux.**Taille max. :** 40 cm, commune jusqu'à 25 cm.**Méth.capt. :** chaluts de fond, sennes de plage, trémails, lignes.**Habitat :** eaux côtières peu profondes, estuaires et lagunes saumâtres, y compris la mangrove.**Noms toc. :**

POISSONS OSSEUX

MUGILIDAE

Mugil bananensis (Pellegrin, 1928)


Noms FAO : An - Banana mullet; Es - Liza banana; Fr - Mulet banane.

Taille max. : environ 40 cm, commune jusqu'à 30 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, sennes de plage, trémails, lignes.

Habitat : fréquente les eaux côtières et les estuaires.

Noms loc. :

***Mugil cephalus*** Linnaeus, 1758

Synonymes : *Mugil ashanteensis* Bleeker, 1863.


Noms FAO : An - Flathead grey mullet; Es - Pardete; Fr - Mulet cabot.

Taille max. : 120 cm, commune jusqu'à 50 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, sennes de plage, éperviers, lignes.

Habitat : fréquente les eaux côtières, les estuaires et les lagunes.

Noms loc. :



(voir planche VII, 52)

Mugil curema Valenciennes, 1836

Synonymes : *Mugil brasiliensis* Günther, 1861 (non Spix); *Mugil metzelaari* Chabanaud, 1976.


Noms FAO : An - Curema mullet; Es - Liza curema; Fr - Mulet curème.

Taille max. : 35 cm, commune jusqu'à 25 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, sennes de plage, trémails.

Habitat : fréquente les eaux côtières, les estuaires et les lagunes.

Noms loc. :



MULLIDAE

Pseudupeneus prayensis (Cuvier, 1829)


Noms FAO : An - West African goatfish; Es - Salmonete barbudo; Fr - Rouget-barbet du Sénégal.

Taille max. : 33 cm, commune jusqu'à 25 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, filets maillants de fond calés, lignes.

Habitat : fréquente les fonds sableux et vaseux de 1 à 60 m, plus communément entre 20 et 45 m.

Noms loc. :



(voir planche VII, 53)

POISSONS OSSEUX

MURAENESOCIDAE

Cynoponticus ferox Costa, 1846

Synonymes : *Muraenesox ferox* (Costa, 1846); *Phyllogramma regani* Pellegrin, 1934.


Noms FAO : An - Guinea pike conger; Es - Murenocio de Guinea; Fr - Murénésoce de Guinée.

Taille max. : 2 m.

Méth.capt. : chaluts de fond, lignes.

Habitat : sur fonds sableux et vaseux, de 10 à 100 m de profondeur.

Noms loc. :



MURAENIDAE

Channomuraena vittata (Richardson, 1844)


Noms FAO : An - Broadbanded moray; Es - Morena franjeada; Fr - Murène anneau.

Taille max. : 120 cm.

Méth.capt. : lignes, pièges.

Habitat : peu commune, insulaire, vivant sur le fond à des profondeurs atteignant 40 m.

Noms loc. :



Echidna peli (Kaup, 1856)


Noms FAO : An - Pebbletooth moray; Es - Moreneta; Fr - Murène serpent.

Taille max. : 90 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, pièges, lignes.

Habitat : trouvée dans les habitats rocheux en eaux peu profondes.

Noms loc. :



Enchelycore nigricans (Bonnaterre, 1788)

Noms FAO : An - Viper moray; Es - Morena negra; Fr - Murène noire.

Taille max. : 100 cm.

Méth.capt. : lignes, pièges.

Habitat : régions rocheuses et coralliennes, jusqu'à 12 m de profondeur.

Noms loc. :

