

## POISSONS OSSEUX

## SOLEIDAE

***Microchirus boscanion*** Chabanaud, 1926

**Noms FAO :** **An** - Lusitanian sole; **Es** - Lenguado lusitánico; **Fr** - Sole lusitanienne.


**Taille max. :** 20 cm, commune jusqu'à 10 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond.

**Habitat :** espèce démersale, sur les fonds sableux du plateau continental.

**Noms loc. :**

rayons sombres régulièrement espacés sur la dorsale et l'anale



petites barres noires sur le corps

***Microchirus frechkopi*** Chabanaud, 1952

**Noms FAO :** **An** - Frechkop's sole; **Es** - Lenguado de Frechkop; **Fr** - Sole de Frechkop.


**Taille max. :** 20 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond.

**Habitat :** espèce démersale sur fonds sableux et vaseux du plateau continental.

**Noms loc. :**

face oculée avec des ocelles sombres à la base des nageoires impaires



bandes longitudinales claires

***Microchirus ocellatus*** (Linnaeus, 1758)

**Synonymes :** *Monochirus ocellatus* (Linnaeus, 1758).

**Noms FAO :** **An** - Four-eyed sole; **Es** - Tambor real; **Fr** - Sole ocellée.

**Taille max. :** 20 cm environ, commune jusqu'à 15 cm.


**Méth.capt. :** chaluts de fond.

**Habitat :** espèce démersale, sur fonds vaseux et sableux, entre 40 et 300 m de profondeur.

**Noms loc. :**

4 ocelles

grande tache sombre sur la ligne latérale



face oculée rougeâtre à brunâtre

***Microchirus wittei*** Chabanaud, 1950


**Noms FAO :** **An** - Bandeo sole; **Es** - Tambor de bandas; **Fr** - Sole fasciée.

**Taille max. :** 15 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond

**Habitat :** démersale sur fonds sableux et vaseux.

**Noms loc. :**



bandes transversales alternativement sombres et claires

## POISSONS OSSEUX

## SOLEIDAE

***Monochirus hispidus*** Rafinesque, 1814

**Synonymes** : *Monochirus atlanticus* Chabanaud, 1940.


**Noms FAO** : **An** - Whiskered sole; **Es** - Spoldado; **Fr** - Sole velue.

**Taille max.** : 20 cm environ , commune jusqu'à 10 cm.

**Méth.capt.** : chaluts de fond, sennes, de plage.

**Habitat** : espèce démersale, sur fonds sableux et vaseux, de 10 à 250 m de profondeur.

**Noms loc.** :



corps avec des taches et barres sombres irrégulières

***Pegusa cadenati*** Chabanaud, 1948


**Noms FAO** : **An** - Cadenat's sole; **Es** - Sortija de Cadenat; **Fr** - Sole de Cadenat.

**Taille max.** : 18 cm.

**Méth.capt.** : chaluts de fond, sennes de plage.

**Habitat** : eaux peu profondes sur fonds sableux, entre 10 et 30 m de profondeur.

**Noms loc.** :



face oculée couverte de gros points bruns ou noirs

narine antérieure du côté aveugle dilatée en forme de rosette

***Pegusa lascaris*** (Risso, 1810)

(voir planche XI, 86)

**Synonymes** : *Solea lascaris* (Risso, 1810).

**Noms FAO** : **An** - Sand sole; **Es** - Sortija; **Fr** - Sole-pole.


**Taille max.** : 40 cm, commune jusqu'à 30 cm.

**Méth.capt.** : chaluts de fond, sennes de plage.

**Habitat** : fréquente différents types de fond de 5 à 300 m, plus commune entre 10 et 50 m.

**Noms loc.** :

(voir planche XI, 86)



narine antérieure du côté aveugle dilatée en forme de rosette

tache noire

***Pegusa triophthalmus*** (Bleeker, 1863)

**Synonymes** : *Pegusa triophthalma* (Bleeker, 1863)


**Noms FAO** : **An** - Cyclope sole; **Es** - Sortija tres ojos; **Fr** - Sole-pole à trois taches.

**Taille max.** : 28 cm.

**Méth.capt.** : chaluts de fond, sennes de plage.

**Habitat** : fréquente les fonds sableux entre 10 et 30 m.

**Noms loc.** :



3 taches rondes sur la ligne latérale

narine antérieure du côté aveugle dilatée en forme de rosette

## POISSONS OSSEUX

## SOLEIDAE

***Synaptura cadenati*** Chabanaud, 1848


**Noms FAO :** An - Guinean sole; Es - Lenguado de Cadenat; Fr - Sole-ruardon du Golfe.

**Taille max. :** 35 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond et sennes de plage.

**Habitat :** fréquente les fonds sableux et vaseux de 0 à 50 m de profondeur.

**Noms loc. :**

***Synaptura lusitanica*** Capello, 1868


**Noms FAO :** An - Portuguese sole; Es - Lenguado portugués; Fr - Sole-ruardon commune.

**Taille max. :** 35 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond.

**Habitat :** fréquente des fonds vaseux et sableux entre 0 et 60 m de profondeur.

**Noms loc. :**

***Synapturichthys kleinii*** (Risso, 1826)


**Noms FAO :** An - Klein's sole; Es - Lenguado manchado; Fr - Sole tachetée.

**Taille max. :** 40 cm environ.

**Méth.capt. :** chaluts de fond.

**Habitat :** sur des fonds sableux et vaseux, de 20 à 120 m de profondeur.

**Noms loc. :**

***Vanstraelenia chirophthalmus*** (Regan, 1915)

**Synonymes :** *Vanstraelenia insignis* Chabanaud, 1950; *Xenobuglossus elongatus* Chabanaud, 1950.


**Noms FAO :** An - African solenette; Es - Lenguadillo africano; Fr - Sole-pole.

**Taille max. :** 20 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond.

**Habitat :** fonds sableux ou vaseux, entre 15 et 100 m de profondeur.


**Noms loc. :**



## POISSONS OSSEUX

***Boops boops*** (Linnaeus, 1758)**Synonymes** : *Box boops* (Linnaeus, 1758).**Noms FAO** : An - Bogue; Es - Boga; Fr - Bogue.**Taille max.** : 25 cm, mais rarement plus de 18 cm.**Méth.capt.** : chaluts de fond, sennes coulissantes, sennes de plage, lignes; utilisée comme appât dans la pêche au thon.**Habitat** : cette espèce démersale a aussi un comportement semi-pélagique et se retrouve sur tous les types de fond. On la rencontre plus couramment entre 0 et 100 m.**Noms loc.** :

(voir planche XII, 87)

***Dentex angolensis*** Poll & Maul, 1953**Synonymes** : *Dentex polli* Roux, 1954.**Noms FAO** : An - Angola dentex; Es - Dentón angolés; Fr - Denté angolais.**Taille max.** : 35 cm, commune jusqu'à 25 cm.**Méth.capt.** : chaluts de fond, lignes de fond.**Habitat** : fréquente différents types de fonds du plateau et talus continentaux (100 à 300 m). Cohabite avec *Dentex macrophthalmus*.**Noms loc.** :

yeux grande faunes dans le poisson vivant

9 ou 10 branchiospines inférieures

petite tache sombre

profil rectiligne

espace large

(voir planche XII, 88)

***Dentex barnardi*** Cadenat, 1964**Noms FAO** : An - Barnard dentex; Es - Chacarona sureña; Fr - Denté austral.**Taille max.** : 40 cm, commune jusqu'à 25 cm.**Méth.capt.** : chaluts de fond.**Habitat** : espèce démersale sur fonds chalutables de 40 à 100 m de profondeur.**Noms loc.** :