

## POISSONS OSSEUX

***Pagellus acarne*** (Risso, 1826)

SPARIDAE


**Noms FAO :** An - Axillary seabream; Es - Aligote; Fr - Pageot acarné.

**Taille max. :** 35 cm, commune jusqu'à 25 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond, sennes de plage, lignes.

**Habitat :** espèce démersale; fréquente différents types de fonds entre 40 et 100 m.

**Remarques:** présence dans le golfe de Guinée à confirmer.

***Pagellus bellottii*** Steindachner, 1882

**Synonymes :** *Pagellus coupei* Dieuzeide, 1960.


**Noms FAO :** An - Red pandora; Es - Breca colorada; Fr - Pageot à tache rouge.

**Taille max. :** 40 cm, commune jusqu'à 20 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond, lignes.

**Habitat :** fréquente les fonds durs et sableux jusqu'à 100 m. Vit en bancs. Espèce de pageot la plus commune, pêchée durant toute l'année.

**Noms loc. :**

***Pagellus bogaraveo*** (Brünnich, 1768)

**Synonymes :** *Pagellus centrodontus* Delaroche, 1809.

**Noms FAO :** An - Blackspot seabream; Es - Goraz; Fr - Dorade rose.


**Taille max. :** 65 cm, commune jusqu'à 35 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond.

**Habitat :** espèce démersale sur fonds variés (roches, sable, vase) jusqu'à 700 m de profondeur.

**Remarques:** présence dans le golfe de Guinée à confirmer.

**Noms loc. :**

***Pagrus auriga*** Valenciennes, 1843

(voir planche XIV, 103)

**Synonymes :** souvent confondue avec *Pagrus caeruleostictus* (Valenciennes, 1830)


**Noms FAO :** An - Redbanded seabream; Es - Pargo sémola; Fr - Pagre rayé.

**Taille max. :** 60 cm, commune jusqu'à 40 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond, filets maillants de fond calés, lignes.

**Habitat :** fréquente les fonds côtiers rocheux et sableux jusqu'à 170 m.

**Noms loc. :**



POISSONS OSSEUX

SPARIDAE

***Pagrus caeruleostictus*** (Valenciennes, 1830)

**Synonymes :** *Sparus caeruleostictus* (Valenciennes, 1830); *Sparus ehrenbergii* Valenciennes, 1830.


**Noms FAO :** An - Bluespotted seabream; Es - Pargo zapata; Fr - Pagre à points bleus.

**Taille max. :** 70 cm, commune jusqu'à 30 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond, lignes.

**Habitat :** sur fonds durs et sablovaseux jusqu'à 150 m (commune entre 30 et 50 m)

**Noms loc. :**



(voir planche XV, 104)

***Pagrus pagrus africanus*** (Akazaki, 1962)

**Synonymes :** *Sparus pagrus africanus* Akazaki, 1962; *Pagrus pagrus* Linnaeus, 1758 (p.p.); *Pagrus vulgaris* Valenciennes, 1830 (p.p.).


**Noms FAO :** An - Southern common seabream; Es - Pagro sureño; Fr - Pagre des tropiques.

**Taille max. :** 75 cm, commune jusqu'à 30 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond, filets calés de fond.

**Habitat :** espèce démersale des fonds durs, vaseux ou sableux (jusqu'à 200 m).

**Noms loc. :**



***Sarpa salpa*** (Linnaeus, 1758)

**Synonymes :** *Boops salpa* (Linnaeus, 1758).


**Noms FAO :** An - Salema; Es - Salema; Fr - Saupe.

**Taille max. :** 45 cm, commune jusqu'à 30 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond, sennes de plage, trémails, lignes.

**Habitat :** fréquente les fonds rocheux et sableux côtiers couverts d'algues.

**Noms loc. :**



(voir planche XV, 105)

***Sparus aurata*** Linnaeus, 1758

**Noms FAO :** An - Gilthead seabream; Es - Pargo dorado; Fr - Dorade royale.


**Taille max. :** 70 cm, commune jusqu'à 40 cm.

**Méth.capt. :** chaluts de fond, sennes de plage, lignes.

**Habitat :** espèce côtière des fonds sableux et des herbiers marins.

**Remarques :** présence dans le golfe de Guinée à confirmer.

**Noms loc. :**



mâchoires et dents

## POISSONS OSSEUX

***Spondyliosoma cantharus* (Linnaeus, 1758)**

4-6 rangées de dents pointues

SPARIDAE

**Synonymes** : *Cantharus cantharus* (Linnaeus, 1758).

**Noms FAO** : An - Black seabream; Es - Pargo chopá; Fr - Dorade grise.

**Taille max.** : 60 cm, commune jusqu'à 30 cm.


**Méth.capt.** : chaluts de fond et pélagiques, sennes de plage, lignes.

**Habitat** : espèce démersale de 100 à 150 cm de profondeur.

**Noms loc.**



mâchoire inférieure (vue latérale)



lignes longitudinales jaune doré, plus ou moins discontinues

(voir planche XV, 106)

***Sphyraena afra* Peters, 1844**

écailles petites, 122 à 140 pores sur la ligne latérale

SPHYRAENIDAE

**Synonymes**: *Sphyraena piscatorum* Cadenat, 1964; *Sphyraena piscatorium* Williams, 1968; aussi citée incorrectement comme *Sphyraena jello* (non Cuvier) quoique cette espèce ne se trouve pas dans l'Atlantique est.

**Noms FAO** : An - Guinean barracuda; Es - Espetón de Guinea; Fr - Bécune guinéenne.

**Taille max.** : 205 cm, commune jusqu'à 80 cm.

**Méth.capt.**: chaluts de fond, filets maillants calés, lignes à main, traînes.

**Habitat** : fréquente les eaux côtières et les estuaires.

**Noms loc.** :



flancs marqués par environ 20 chevrons sombres.

***Sphyraena barracuda* (Walbaum, 1792)**

écailles grandes, moins de 90 pores sur la ligne latérale

**Synonymes** : *Sphyraena picuda* Bloch & Schneider, 1801.


**Noms FAO** : An - Great barracuda; Es - Picuda barracuda; Fr - Barracuda.

**Taille max.** : 180 cm, commune jusqu'à 50 cm.

**Méth.capt.** : chaluts de fond, filets calés de fond, sennes coulissantes, traînes, hameçons, crochets.

**Habitat** : peu d'informations disponibles, mais cette espèce semble effectuer des migrations.

**Noms loc.**



maxillaire dépassant le bord antérieur de l'oeil

origine de la 1<sup>e</sup> dorsale derrière l'origine des pelviennes

plusieurs tache irrégulières sombres

***Sphyraena guachancho* Cuvier, 1829**

**Synonymes** : *Sphyraena dubia* Bleeker, 1863; *Sphyraena guaguanche* Poey, 1860.


**Noms FAO** : An - Guachanche barracuda; Es - Picuda guaguanche; Fr - Bécune guachanche.

**Taille max.** : 70 cm, commune jusqu'à 50 cm.

**Méth.capt.** : chaluts, filets calés de fond, lignes à main.

**Habitat** : fréquente les estuaires et les fonds vaseux ainsi que les eaux côtières turbides (de 3 à 100 m).

**Noms loc.** :



écailles de taille modérée, 102-119 pores sur la ligne latérale

une bande jaune horizontale sur les flancs chez les exemplaires frais

nageoires pectorales légèrement en avant de la 1<sup>e</sup> dorsale

chevrons

derniers rayons plus longs

## POISSONS OSSEUX

***Sphyraena sphyraena*** (Linnaeus, 1758)

## SPHYRAENIDAE

**Synonymes** : *Sphyraena spet* Lacepède, 1803; *Sphyraena vulgaris* Cuvier, 1829 (in part); *Sphyraena bocagei* Osorio, 1891; *Sphyraena sphyraena bocagei* [Cadenat, 1964].


**Noms FAO** : **An** - European barracuda; **Es** - Espetón; **Fr** - Bécune européenne.

**Taille max.** : 165 cm, commune jusqu'à 50 cm.

**Méth.capt.** : chaluts, filets maillants calés, sennes, sennes de plage, lignes à main, lignes.

**Habitat** : fréquente les eaux côtières et hauturières.

**Noms loc.** :

***Stromateus fiatola*** Linnaeus, 1758

## STROMATEIDAE

**Synonymes** : *Stromateus fasciatus* (Risso, 1826); *Stromateus microchirus* (Cuvier & Valenciennes, 1833); *Stromateus capensis* Pappe, 1866.


**Noms FAO** : **An** - Butterfish; **Es** - Palometa fiátola; **Fr** - Fiatole.

**Taille max.** : 50 cm, commune jusqu'à 35 cm.

**Méth.capt.** : chaluts de fond, sennes coulissantes.

**Habitat** : pélagique, en bancs, fréquente les eaux côtières, de 10 à 70 m de profondeur.

**Noms loc.** :

***Saurida brasiliensis*** Norman, 1935

## SYNODONTIDAE

**Synonymes** : *Saurida parri* Norman, 1935.


**Noms FAO** : **An** - Brazilian lizardfish; **Es** - Lagarto brasileiro; **Fr** - Anoli brésilien.

**Taille max.** : 25 cm, commune jusqu'à 15 cm.

**Méth.capt.** : chaluts de fond.

**Habitat** : démersale sur le plateau continental, de 18 à 410 m de profondeur.

**Noms loc.** :

***Synodus saurus*** (Linnaeus, 1758)

**Synonymes** : *Saurus griseus* Lowe, 1938; *Synodus cinereus* Hildebrand, 1948.

**Noms FAO** : **An** - Atlantic lizardfish; **Es** - Pez de San Francisco; **Fr** - Anofl de l'Atlantique.

**Taille max.** : 40 cm, commune jusqu'à 25 cm.

**Méth.capt.** : chaluts de fond, filets calés de fond, trémails, lignes.

**Habitat** : aucune donnée disponible.

**Remarques** : présence dans le golfe de Guinée à confirmer.

**Noms loc.** :

