

### 3. PROVISIONAL LIST OF NOMINAL SPECIES OF LUTJANIDAE

The following list gives in order (1) the scientific name, as it originally appeared, in alphabetical order according to the specific or subspecific name; (2) the author or authors (*in* Cuvier & Valenciennes is abbreviated C. & V. and Bloch and Schneider is abbreviated B. & S.); (3) date of publication; (4) present identification; (5) general distribution code in parentheses: EP (eastern Pacific), IP (Indo-West Pacific); EA (eastern Atlantic), WA (western Atlantic).

<u>Lutjanus acutirostris</u> Desmarest, 1823	<u>Lutjanus apodus</u>	(WA)
<u>Diacope adetii</u> Castelnau, 1873	<u>Lutjanus adetii</u>	(IP)
<u>Lutjanus agennes</u> Bleeker, 1863	<u>Lutjanus agennes</u>	(EA)
<u>Diacope alboguttata</u> Valenciennes (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus rivulatus</u>	(IP)
<u>Bodianus albostratus</u> B. & S., 1801	<u>Lutjanus apodus</u>	(WA)
<u>Rooseveltia aloha</u> Jordan & Snyder, 1907	<u>Pristipomoides zonatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus altifrontalis</u> Chan, 1970	<u>Lutjanus erythropterus</u>	(IP)
<u>Genyoroqe amabilis</u> De Vis, 1885	<u>Lutjanus adetii</u>	(IP)
<u>Mesoprion ambiguus</u> Poey, 1860	<u>Lutjanus ambiguus</u>	(WA)
<u>Diacope amboinensis</u> Bleeker, 1852	<u>Lutjanus boutton</u>	(IP)
<u>Platyinius amoenus</u> Snyder, 1911	<u>Pristipomoides argyrogrammicus</u>	(IP)
<u>Diacope analis</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	<u>Lutjanus fulvus</u>	(IP)
<u>Mesoprion analis</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus analis</u>	(WA)
<u>Pristipomoides andersoni</u> Ginsburg, 1952	<u>Pristipomoides aquilonaris</u>	(WA)
<u>Diacope angulus</u> Bennett, 1831	<u>Lutjanus notatus</u>	(IP)
<u>Mesoprion annularis</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus erythropterus</u>	(IP)
<u>Perca apoda</u> Walbaum, 1792	<u>Lutjanus apodus</u>	(WA)
<u>Anthias aquilonaris</u> Goode & Bean, 1896	<u>Pristipomoides aquilonaris</u>	(WA)
<u>Mesoprion aratus</u> Günther, 1864	<u>Lutjanus aratus</u>	(EP)
<u>Sciaena argentata</u> Gmelin, 1789	<u>Lutjanus argentimaculatus</u>	(IP)
<u>Mesoprion argenteus</u> Hombron & Jacquinot, 1853	<u>Lutjanus fulvus</u>	(IP)
<u>Sciaena argentimaculatus</u> Forsskål, 1775	<u>Lutjanus argentimaculatus</u>	(IP)
<u>Mesoprion argentiventris</u> Peters, 1869	<u>Lutjanus argentiventris</u>	(EP)
<u>Serranus argyrogrammicus</u> Valenciennes (in C. & V.), 1831	<u>Pristipomoides argyrogrammicus</u>	(IP)
<u>Aprion ariomms</u> Jordan & Gilbert, 1883	<u>Rhomboplites aurorubens</u>	(WA)
<u>Mesoprion arnillo</u> Poey, 1860	<u>Apsilus dentatus</u>	(WA)
<u>Lutjanus aubrieti</u> Desmarest, 1832	<u>Lutjanus synagris</u>	(WA)
<u>Diacope aurantiaca</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	<u>Lutjanus fulvus</u>	(IP)
<u>Mesoprion aureovittatus</u> Macleay, 1879	<u>Lutjanus fulviflamma</u>	(IP)
<u>Arnillo auricilla</u> Jordan, Evermann & Tanaka, 1927	<u>Pristipomoides auricilla</u>	(IP)
<u>Mesoprion auro-lineatus</u> Cuvier (in C. & V.), 1830	<u>Lutjanus fulviflamma</u>	(IP)
<u>Centropristis aurorubens</u> Cuvier (in C. & V.), 1829	<u>Rhomboplites aurorubens</u>	(WA)
<u>Mesoprion aurovittatus</u> Agassiz, 1829	<u>Ocyurus chrysurus</u>	(WA)
<u>Diacope axillaris</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	<u>Lutjanus gibbus</u>	(IP)
<u>Holocentrus bengalensis</u> Bloch, 1790	<u>Lutjanus bengalensis</u>	(IP)
<u>Genyoroqe bidens</u> Macleay, 1883	<u>Lutjanus gibbus</u>	(IP)
<u>Serranus biguttatus</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	<u>Lutjanus biguttatus</u>	(IP)
<u>Diacope bitaeniatus</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	<u>Lutjanus bitaeniatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus blackfordi</u> Goode & Bean, 1879	<u>Lutjanus campechanus</u>	(WA)
<u>Lutjanus Blochii</u> Lacepède, 1802	<u>Lutjanus lutjanus</u>	(IP)
<u>Sciaena bohar</u> Forsskål, 1775	<u>Lutjanus bohar</u>	(IP)
<u>Diacope borensis</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus gibbus</u>	(IP)
<u>Diacope bottonensis</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus boutton</u>	(IP)
<u>Holocentrus boutton</u> Lacepède, 1803	<u>Lutjanus boutton</u>	(IP)
<u>Etelis brevirostris</u> Vaillant, 1873	<u>Pristipomoides filamentosus</u>	(IP)
<u>Serranus brighami</u> Seale, 1901	<u>Pristipomoides zonatus</u>	(IP)
<u>Mesoprion buccanella</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus buccanella</u>	(WA)
<u>Anthias caballerote</u> B. & C., 1801	<u>Lutjanus griseus</u>	(WA)
<u>Apharus caeruleus</u> Cuvier (in C. & V.), 1830	<u>Aphareus furcatus</u>	(IP)
<u>Vegetichthys caeruleus</u> Katayama, 1934	<u>Paracaesio caeruleus</u>	(IP)
<u>Diacope calveti</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus timorensis</u>	(IP)
<u>Mesoprion campechanus</u> Poey, 1860	<u>Lutjanus campechanus</u>	(WA)
<u>Lutjanus campechianus</u> Poey, 1875	<u>Lutjanus campechanus</u>	(WA)
<u>Aetiasis cantharoides</u> Barnard, 1937	<u>Paracaesio xanthurus</u>	(IP)
<u>Etelis carbunculus</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Etelis carbunculus</u>	(IP)
<u>Tangia carnolabrum</u> Chan, 1970	<u>Lipocheilus carnolabrum</u>	(IP)
<u>Mesoprion caroui</u> Cuvier (in C. & V.), 1831	<u>Lutjanus lutjanus</u>	(IP)
<u>Mesoprion carponotatus</u> Richardson, 1842	<u>Lutjanus carponotatus</u>	(IP)

<u>Lutjanus castelnaui</u> Whitley, 1928	
<u>Caius catus</u> Buchanan, 1822	
<u>Mesoprion caudalis</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	
<u>Mesoprion caudanotatus</u> Poey, 1851	
<u>Sparus taxis</u> B. & S., 1801	
<u>Mesoprion chirtah</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	
<u>Mesoprion chrysotaenia</u> Bleeker, 1851	
<u>Sparus chrysurus</u> Bloch, 1790	
<u>DiaCOPE civis</u> Valenciennes (in C. & V.), 1831	
<u>Lutjanus coatesi</u> Whitley, 1934	
<u>DiaCOPE coccinea</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	
<u>DiaCOPE coeruleo-lineata</u> Rüppell, 1835	
<u>DiaCOPE coeruleo-punctata</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	
<u>DiaCOPE coeruleovittata</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	
<u>Lutjanus colorado</u> Jordan & Gilbert, 1881	
<u>Lutjanus comoriensis</u> Fourmanoir, 1957	
<u>Etelis coruscans</u> Valenciennes, 1862	
<u>Lutjanus cubera</u> Poey, 1871	
<u>Mesoprion cyanopterus</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	
<u>Mesoprion cynodon</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	
<u>DiaCOPE decemlineata</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	
<u>Mesoprion decussatus</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	
<u>Apsilus dentatus</u> Guichenot, 1853	
<u>Mesoprion dentatus</u> Duméril, 1858	
<u>Mesoprion dodecacanthoides</u> Bleeker, 1854a	
<u>Mesoprion dodecacanthus</u> Bleeker, 1853	
<u>Chaetopterus dubius</u> Günther, 1859	
<u>DiaCOPE duodecemlineata</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	
<u>Lutjanus ehrenbergii</u> Peters, 1869	
<u>Mesoprion elegans</u> Poey, 1860	
<u>Mesoprion elongatus</u> Hombron & Jacquinot, 1852	
<u>Sparopsis elongatus</u> Kner, 1868	
<u>Lobotes emarginatus</u> Baird & Girard, 1855	
<u>Lutjanus endecacanthus</u> Bleeker, 1863a	
<u>Mesoprion enneacanthus</u> Bleeker, 1849	
<u>DiaCOPE erythrina</u> Rüppell, 1838	
<u>Mesoprion erythrognathus</u> Valenciennes (in C. & V.), 1831	
<u>Lutjanus erythropterus</u> Bloch, 1790	
<u>Mesoprion etaape</u> Lesson, 1830	
<u>Lutjanus eutactus</u> Bleeker, 1863a	
<u>Etelis evurus</u> Jordan & Evermann, 190	
<u>Bodianus fasciatus</u> B. & S., 1801	
<u>Etelis filamentosus</u> Fourmanoir, 1970	
<u>Serranus filamentosus</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	
<u>Mesoprion flavescens</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	
<u>DiaCOPE flavipes</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	
<u>Mesoprion flavipinnis</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	
<u>Pristipomoides flavipinnis</u> Shinohara, 1963	
<u>Mesoprion flaviroseus</u> De Vis, 1884	
<u>Aphareus flavivultus</u> Jenkins, 1901	
<u>Symphorus forsteri</u> Fowler, 1933	
<u>Pristipomoides freemmani</u> Anderson, 1966	
<u>Mesoprion fulgens</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	
<u>Sciaena fulviflamma</u> Forsskål, 1775	
<u>Holocentrus fulvus</u> Schneider (in B. & S.), 1801	
<u>Labrus furcatus</u> Lacepède, 1802	
<u>Lutjanus furvicaudatus</u> Fowler, 1904	
<u>Mesoprion fuscescens</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	
<u>Apsilus fuscus</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	
<u>Mesoprion gaimardj</u> Bleeker, 1859	
<u>Mesoprion garretti</u> Gunther, 1873	
<u>Alphestes gembra</u> Schneider (in B. & S.), 1801	
<u>Sciaena gibba</u> Forsskål, 1775	
<u>Mesoprion goldiei</u> Macleay, 1882	
<u>Paracaesio gonzalesi</u> Fourmanoir & Rivaton, 1979	
<u>Mesoprion goreensis</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	
<u>Genyoroge grammica</u> Day, 1870	
<u>Mesoprion griseoides</u> Guichenot, 1862	
<u>Labrus griseus</u> Linnaeus, 1758	
<u>Lutjanus guilcheri</u> Fourmanoir, 1959	
<u>Lutjanus adetii</u>	(IP)
<u>Lutjanus johnii</u>	(IP)
<u>Lutjanus lunulatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus buccanella</u>	(WA)
<u>Lutjanus apodus</u>	(WA)
<u>Lutjanus erythropterus</u>	(IP)
<u>Lutjanus carponotatus</u>	(IP)
<u>Ocyurus chrysurus</u>	(WA)
<u>Lutjanus sebae</u>	(IP)
<u>Lutjanus bohar</u>	(IP)
<u>Lutjanus gibbus</u>	(IP)
<u>Lutjanus coeruleolineatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus rivulatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus notatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus colorado</u>	(EP)
<u>Lutjanus gibbus</u>	(IP)
<u>Etelis coruscans</u>	(IP)
<u>Lutjanus cyanopterus</u>	(WA)
<u>Lutjanus cyanopterus</u>	(WA)
<u>Lutjanus apodus</u>	(WA)
<u>Lutjanus quinquelineatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus decussatus</u>	(IP)
<u>Apsilus dentatus</u>	(WA)
<u>Lutjanus dentatus</u>	(EA)
<u>Lutjanus dodecacanthoides</u>	(IP)
<u>Lutjanus malabaricus</u>	(IP)
<u>Pristipomoides sieboldii</u>	(IP)
<u>Lutjanus notatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus ehrenbergii</u>	(IP)
<u>Rhomboplites aurorubens</u>	(WA)
<u>Lutjanus biguttatus</u>	(IP)
<u>Aprion virescens</u>	(IP)
<u>Lutjanus griseus</u>	(WA)
<u>Lutjanus endecacanthus</u>	(EA)
<u>Lutjanus vitta</u>	(IP)
<u>Lutjanus sanguineus</u>	(IP)
<u>Lutjanus lutjanus</u>	(IP)
<u>Lutjanus erythropterus</u>	(IP)
<u>Lutjanus kasmira</u>	(IP)
<u>Lutjanus dentatus</u>	(EA)
<u>Etelis coruscans</u>	(IP)
<u>Lutjanus apodus</u>	(WA)
<u>Randallichthys filamentosus</u>	(IP)
<u>Pristipomoides filamentosus</u>	(IP)
<u>Lutjanus apodus</u>	(WA)
<u>Lutjanus fulvus</u>	(IP)
<u>Lutjanus argentimaculatus</u>	(IP)
<u>Pristipomoides flavipinnis</u>	(IP)
<u>Lutjanus boutton</u>	(IP)
<u>Aphareus furcatus</u>	(IP)
<u>Symphorus nematophorus</u>	(IP)
<u>Pristipomoides freemmani</u>	(WA)
<u>Lutjanus fulgens</u>	(EA)
<u>Lutjanus fulviflamma</u>	(IP)
<u>Lutjanus fulvus</u>	(IP)
<u>Aphareus furcatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus lemniscatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus fuscescens</u>	(IP)
<u>Apsilus fuscus</u>	(EA & IP)
<u>Lutjanus fulvus</u>	(IP)
<u>Lutjanus argentimaculatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus argentimaculatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus gibbus</u>	(IP)
<u>Lutjanus goldiei</u>	(IP)
<u>Paracaesio gonzalesi</u>	(IP)
<u>Lutjanus goreensis</u>	(EA)
<u>Lutjanus quinquelineatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus argentimaculatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus griseus</u>	(WA)
<u>Lutjanus guilcheri</u>	(IP)

<u>Lutjanus guineensis</u> Bleeker, 1863	<u>Lutjanus goreensis</u>	(EA)
<u>Hoplopagrus guntheri</u> Gill, 1862	<u>Hoplopagrus guntheri</u>	(EP)
<u>Mesoprion guttatus</u> Steindachner, 1869	<u>Lutjanus guttatus</u>	(IP)
<u>Centropomus hober</u> Lacepède, 1803	<u>Lutjanus fulviflamma</u>	(IP)
<u>Mesoprion hoteen</u> Richardson, 1846	<u>Lutjanus fuscescens</u>	(IP)
<u>Diacope immaculata</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus fulvus</u>	(IP)
<u>Mesoprion immaculatus</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus lemniscatus</u>	(IP)
<u>Mesoprion inermis</u> Peters, 1869	<u>Lutjanus inermis</u>	(EP)
<u>Mesoprion isodon</u> Valenciennes (in C. & V.), 1833	<u>Lutjanus analis</u>	(WA)
<u>Mesoprion janthinuropterus</u> Bleeker, 1852a	<u>Lutjanus lemniscatus</u>	(IP)
<u>Mesoprion janthinurus</u> Bleeker, 1854	<u>Lutjanus gibbus</u>	(IP)
<u>Anthias jocu</u> B. & S., 1801	<u>Lutjanus jocu</u>	(WA)
<u>Anthias johnii</u> Bloch; 1792	<u>Lutjanus johnii</u>	(IP)
<u>Lutjanus jongarah</u> Day, 1875	<u>Lutjanus argentimaculatus</u>	(IP)
<u>Neomaensis jordani</u> Gilbert, 1897	<u>Lutjanus jordani</u>	(EP)
<u>Mesoprion kagoshima</u> Steindachner & Doederlein, 1883	<u>Lutjanus fulvus</u>	(IP)
<u>Aprion kanekonis</u> Tanaka, 1935	<u>Pristipomoides filamentosus</u>	(IP)
<u>Sciaena kasmira</u> Forsskål, 1775	<u>Lutjanus kasmira</u>	(IP)
<u>Paracaesio kusakarii</u> Abe, 1960	<u>Paracaesio kusakarii</u>	(IP)
<u>Diacope labuan</u> Thiollière, 1856	<u>Lutjanus bohar</u>	(IP)
<u>Sparopsis latifrons</u> Kner, 1868	<u>Aprion virescens</u>	(IP)
<u>Serranus lemniscatus</u> Valenciennes (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus lemniscatus</u>	(IP)
<u>Mesoprion linea</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus apodus</u>	(WA)
<u>Diacope lineata</u> Quoy & Gaimard, 1824	<u>Lutjanus gibbus</u>	(IP)
<u>Diacope lineolata</u> Rüppell, 1829	<u>Lutjanus lutjanus</u>	(IP)
<u>Lutjanus lioglossus</u> Bleeker, 1873	<u>Lutjanus monostigma</u>	(IP)
<u>Mesoprion litura</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus jocu</u>	(WA)
<u>Lutjanus longmani</u> Whitley, 1937	<u>Lutjanus erythropterus</u>	(IP)
<u>Perca lunulata</u> Park, 1797	<u>Lutjanus lunulatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus lutjanus</u> Bloch, 1790	<u>Lutjanus lutjanus</u>	(IP)
<u>Lutjanus luzonius</u> Evermann & Seale, 1906	<u>Lutjanus boutton</u>	(IP)
<u>Genyoroge macleayana</u> Ramsay, 1883	<u>Lutjanus erythropterus</u>	(IP)
<u>Diacope macolor</u> Lesson, 1827	<u>Macolor niger</u>	(IP)
<u>Centropristes macrophthalmus</u> Müller & Troschel, 1848	<u>Pristipomoides macrophthalmus</u>	(WA)
<u>Macolor macularis</u> Fowler, 1931	<u>Macolor macularis</u>	(IP)
<u>Mesoprion madras</u> Valenciennes (in C. & V.), 1831	<u>Lutjanus madras</u>	(IP)
<u>Mesoprion mahogoni</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus mahogoni</u>	(WA)
<u>Sparus malabaricus</u> Schneider (in B. & S.), 1801	<u>Lutjanus malabaricus</u>	(IP)
<u>Lutjanus maltzani</u> Steindachner, 1882	<u>Lutjanus fulgens</u>	(EA)
<u>Diacope marginata</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus fulvus</u>	(IP)
<u>Lutjanus marginatoides</u> Kendall & Goldsborough, 1911	<u>Lutjanus fulvus</u>	(IP)
<u>Mesoprion marginipinnis</u> Macleay, 1883	<u>Lutjanus fulvus</u>	(IP)
<u>Eteliscus marshi</u> Jenkins, 1903	<u>Etelis carbunculus</u>	(IP)
<u>Mesoprion maus</u> Thiollière, 1856	<u>Lutjanus fulvus</u>	(IP)
<u>Lutjanus maxweberi</u> Popta, 1921	<u>Lutjanus maxweberi</u>	(IP)
<u>Neomaensis megalophthalmus</u> Evermann & Marsh, 1900	<u>Lutjanus synagris</u>	(WA)
<u>Rhomboplitoides megalops</u> Fowler, 1918	<u>Lutjanus lutjanus</u>	(IP)
<u>Lutjanus melanurus</u> Jordan & Gilbert, 1883	<u>Ocyurus chrysurus</u>	(WA)
<u>Mesoprion melanospilos</u> Bleeker, 1852a	<u>Lutjanus boutton</u>	(IP)
<u>Lutjanus melanotaenia</u> Bleeker, 1863	<u>Lutjanus lemniscatus</u>	(IP)
<u>Diacope melanura</u> Rüppell, 1838	<u>Lutjanus gibbus</u>	(IP)
<u>Mesoprion microchir</u> Bleeker, 1853	<u>Aprion virescens</u>	(IP)
<u>Aprion microdon</u> Steindachner, 1876	<u>Pristipomoides filamentotus</u>	(IP)
<u>Chaetopterus microlepis</u> Bleeker, 1869a	<u>Pristipomoides filamentotus</u>	(IP)
<u>Mesoprion mitchelli</u> Günther, 1867	<u>Pinjalo pinjalo</u>	(IP)
<u>Lutjanus mizenkoi</u> Allen & Talbot, 1985	<u>Lutjanus mizenkoi</u>	(IP)
<u>Lutjanus modestus</u> Bleeker, 1863	<u>Lutjanus agennes</u>	(EA)
<u>Mesoprion monostigma</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus monostigma</u>	(IP)
<u>Mesoprion multidens</u> Day, 1870	<u>Pristipomoides multidens</u>	(IP)
<u>Mesoprion myriaster</u> Liénard, 1839	<u>Lutjanus rivulatus</u>	(IP)
<u>Mesoprion nemato</u> horus Bleeker, 1860	<u>Symphorus nematophorus</u>	(IP)
<u>Sciaena nigra</u> Forsskål, 1775	<u>Macolor niger</u>	(IP)
<u>Genyoroge nigricauda</u> De Vis, 1885	<u>Lutjanus fulvus</u>	(IP)
<u>Lutjanus nishikawae</u> Smith & Pope, 1907	<u>Lutjanus russelli</u>	(IP)
<u>Diacope notatus</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus notatus</u>	(IP)
<u>Serranus nouleny</u> Valenciennes (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus lutjanus</u>	(IP)
<u>Lutjanus novemfasciatus</u> Gill, 1862	<u>Lutjanus novemfasciatus</u>	(EP)
<u>Etelis nudimaxillaris</u> Yoshino & Araga, 1975	<u>Randallichthys filamentosus</u>	(IP)
<u>Lutjanus nukuhivae</u> Seale, 1906	<u>Lutjanus bohar</u>	(IP)
<u>Mesoprion obscurus</u> Macleay, 1881	<u>Lutjanus argentimaculatus</u>	(IP)

<u>DiaCOPE octolineata</u> Cuvier (in C. & V.), 1828		
<u>Lutjanus octolineatus</u> Fourmanoir, 1957		(IP)
<u>DiaCOPE octovittata</u> Cuvier (in C. & V.), 1830		(IP)
<u>Etelis oculatus</u> Valenciennes (in C. & V.), 1828		(IP)
<u>Mesoprion oianco</u> Poey, 1860		(IP)
<u>Lutjanus oligolepis</u> Bleeker, 1873		(WA)
<u>Mesoprion olivaceus</u> Cuvier (in C. & V.), 1828		(WA)
<u>Mesoprion Ophuysenii</u> Bleeker, 1860		(IP)
<u>Lutjanus orientalis</u> Seale, 1909		(IP)
<u>Mesoprion pacificus</u> Bocourt, 1868		(IP)
<u>Lutjanus paravitta</u> Postel, 1966		(EP)
<u>Mesoprion pargus</u> Cuvier (in C. & V.), 1828		(EP)
<u>Mesoprion parvidens</u> Macleay, 1883		(IP)
<u>Serranus pavoninus</u> Valenciennes (in C. & V.), 1828		(WA)
<u>Paracaesio pedleyi</u> McCulloch & Waite, 1916		(IP)
<u>Neomaenis peru</u> Nichols & Murphy, 1922		(IP)
<u>Mesoprion phaiotaeniatus</u> Bleeker, 1849		(IP)
<u>Caesio pinjalo</u> Bleeker, 1850		(IP)
<u>Mesoprion pomacanthus</u> Bleeker, 1855		(IP)
<u>Lutjanus prieto</u> Jordan & Gilbert, 1881		(IP)
<u>Mesoprion profundus</u> Poey, 1860		(IP)
<u>Lutjanus purpureus</u> Poey, 1867		(EP)
<u>DiaCOPE quadriguttata</u> Cuvier (in C. & V.), 1828		(WA)
<u>Mesoprion quadripunctatus</u> Günther, 1859		(WA)
<u>Holocentrus quinquelinearis</u> Bloch, 1790		(IP)
<u>Holocentrus quinquelineatus</u> Bloch, 1790		(IP)
<u>Anthias raborubia</u> B. & S., 1801		(IP)
<u>Etelis radiosus</u> Anderson, 1981		(WA)
<u>Mesoprion rangus</u> Cuvier (in C. & V.), 1828		(IP)
<u>Genyroroge regia</u> De Vis, 1885		(IP)
<u>Mesoprion retrospinis</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830		(IP)
<u>DiaCOPE revulina</u> Swainson, 1839		(IP)
<u>Mesoprion ricardi</u> Cuvier (in C. & V.), 1828		(IP)
<u>Ocyurus rijgersmoei</u> Cope, 1871		(WA)
<u>DiaCOPE rivulata</u> Cuvier (in C. & V.), 1828		(WA)
<u>Mesoprion rosaceus</u> Poey, 1870		(IP)
<u>DiaCOPE rosea</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830		(WA)
<u>Mesoprion roseigaster</u> Macleay, 1881		(IP)
<u>Aphareus roseus</u> Castelnau, 1879		(IP)
<u>Mesoprion rubellus</u> Cuvier (in C. & V.), 1828		(IP)
<u>Mesoprion rubens</u> Macelay, 1882		(IP)
<u>DiaCOPE rufolineata</u> Valenciennes (in C. & V.), 1828		(IP)
<u>Mesoprion russelli</u> Bleeker, 1849		(IP)
<u>Aphareus rutilans</u> Cuvier (in C. & V.), 1830		(IP)
<u>Caranxomorus sacrestinus</u> Lacépède, 1803		(IP)
<u>Lutjanus salmonoides</u> Gilchrist & Thompson, 1908		(IP)
<u>DiaCOPE sanguinea</u> Cuvier (in C. & V.), 1828		(IP)
<u>DiaCOPE sebae</u> Cuvier (in C. & V.), 1828		(IP)
<u>Lutjanus semicinctus</u> Quoy & Gaimard, 1824		(IP)
<u>Sparus semiluna</u> Lacépède, 1803		(IP)
<u>Mesoprion sexfasciatus</u> Macleay, 1883		(WA)
<u>Genyroroge notata</u> var. <u>sexlineata</u> Kent, 1893		(IP)
<u>DiaCOPE siamensis</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830		(IP)
<u>Chaetopterus sieboldii</u> Bleeker, 1857		(IP)
<u>DiaCOPE sinal</u> Thiollière, 1857		(IP)
<u>Mesoprion sobra</u> Cuvier (in C. & V.), 1828		(IP)
<u>Paracaesio sordidus</u> Abe & Shinohara, 1962		(WA)
<u>DiaCOPE sparus</u> Temminck & Schlegel, 1842		(IP)
<u>DiaCOPE spilura</u> Bennett, 1832		(IP)
<u>Symphorus spilurus</u> Günther, 1874		(IP)
<u>Pristipomoides squamimaxillaris</u> Kami, 1973		(IP)
<u>Lutjanus steransii</u> Goode & Bean, 1878		(IP)
<u>Lutjanus stellatus</u> Akazaki, 1983		(IP)
<u>Paracaesio stonei</u> Raj & Seeto, 1983		(WA)
<u>DiaCOPE striata</u> Cuvier (in C. & V.), 1828		(IP)
<u>Bodianus striatus</u> B. & S., 1801		(IP)
<u>Genyroroge notata</u> var. <u>sublineata</u> DeVis, 1885		(WA)
<u>DiaCOPE superbus</u> Castelnau, 1878		(IP)
<u>Lutjanus kasmira</u> (in part)		(IP)
<u>Lutjanus bengalensis</u> (in part)		(IP)
<u>Lutjanus notatus</u>		(IP)
<u>Lutjanus bengalensis</u>		(IP)
<u>Etelis oculatus</u>		(WA)
<u>Lutjanus mahogoni</u>		(WA)
<u>Lutjanus ehrenbergii</u>		(IP)
<u>Lutjanus argentimaculatus</u>		(IP)
<u>Lutjanus vitta</u>		(IP)
<u>Lutjanus russelli</u>		(IP)
<u>Lutjanus novemfasciatus</u>		(EP)
<u>Lutjanus adetii</u>		(IP)
<u>Lutjanus cyanopterus</u>		(IP)
<u>Lutjanus rivulatus</u>		(WA)
<u>Lutjanus johnii</u>		(IP)
<u>Paracaesio xanthurus</u>		(IP)
<u>Lutjanus peru</u>		(IP)
<u>Lutjanus vitta</u>		(EP)
<u>Pinjalo pinjalo</u>		(IP)
<u>Lutjanus bengalensis</u> (in part)		(IP)
<u>Lutjanus kasmira</u> (in part)		(IP)
<u>Lutjanus novemfasciatus</u>		(EP)
<u>Lutjanus vivanus</u>		(WA)
<u>Lutjanus purpureus</u>		(WA)
<u>Lutjanus bohar</u>		(IP)
<u>Lutjanus rivulatus</u>		(IP)
<u>Lutjanus quinquelineatus</u>		(IP)
<u>Lutjanus quinquelineatus</u>		(IP)
<u>Ocyurus chrysurus</u>		(WA)
<u>Etelis radiosus</u>		(IP)
<u>Lutjanus bohar</u>		(IP)
<u>Lutjanus sebae</u>		(IP)
?		(IP)
<u>Lutjanus rivulatus</u>		(IP)
<u>Lutjanus mahogoni</u>		(IP)
<u>Ocyurus chrysurus</u>		(WA)
<u>Lutjanus rivulatus</u>		(WA)
<u>Lutjanus analis</u>		(IP)
<u>Lutjanus gibbus</u>		(IP)
<u>Lutjanus argentimaculatus</u>		(IP)
<u>Pristipomoides filamentosus</u>		(IP)
<u>Lutjanus erythropterus</u>		(IP)
<u>Lutjanus bohar</u>		(IP)
<u>Lutjanus boutton</u>		(IP)
<u>Lutjanus russelli</u>		(IP)
<u>Aphareus rutilans</u>		(IP)
<u>Aphareus furcatus</u>		(IP)
<u>Lutjanus argentimaculatus</u>		(IP)
<u>Lutjanus sanguineus</u>		(IP)
<u>Lutjanus sebae</u>		(IP)
<u>Lutjanus semicinctus</u>		(IP)
<u>Ocyurus chrysurus</u>		(WA)
<u>Lutjanus argentimaculatus</u>		(IP)
<u>Lutjanus quinquelineatus</u>		(IP)
<u>Lutjanus sebae</u>		(IP)
<u>Pristipomoides sieboldii</u>		(IP)
<u>Lutjanus rivulatus</u>		(IP)
<u>Lutjanus analis</u>		(WA)
<u>Paracaesio sordidus</u>		(IP)
<u>Pristipomoides multidens</u>		(IP)
<u>Lutjanus quinquelineatus</u>		(IP)
<u>Symphoricichthys spilurus</u>		(IP)
<u>Parapristipomoides squamimaxillaris</u>		(IP)
<u>Lutjanus griseus</u>		(WA)
<u>Lutjanus stellatus</u>		(IP)
<u>Paracaesio stonei</u>		(IP)
<u>Lutjanus gibbus</u>		(IP)
<u>Lutjanus apodus</u>		(WA)
<u>Lutjanus quinquelineatus</u>		(IP)
<u>Lutjanus argenteoculatus</u>		(IP)

<u>Sparus synagris</u> Linnaeus, 1758	<u>Lutjanus synagris</u>	(WA)
<u>Symphorus taeniolatus</u> Günther, 1872	<u>Symphorus nematophorus</u>	(IP)
<u>Mesoprion taeniops</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	<u>Lutjanus argentimaculatus</u>	(IP)
<u>Lutjanus tahitiensis</u> Seale, 1906	<u>Lutjanus gibbus</u>	(IP)
<u>Serranus telfairi</u> Bennett, 1831	<u>Pristipomoides zonatus</u>	(IP)
<u>Mesoprion terubuan</u> Thiollière, 1856	<u>Lutjanus fulviflamma</u>	(IP)
<u>Sparus tetracanthus</u> Bloch, 1791	<u>Lutjanus griseus</u>	(WA)
<u>Mesoprion therapon</u> Day, 1869	<u>Lutjanus decussatus</u>	(IP)
<u>Aphareus thompsoni</u> Fowler, 1923	<u>Aphareus rutilans</u>	(IP)
<u>Diacope tiea</u> Lesson, 1830	<u>Lutjanus gibbus</u>	(IP)
<u>Diacope timorensis</u> Quoy & Gaimard, 1824	<u>Lutjanus timorensis</u>	(IP)
<u>Lutjanus torridus</u> Cope, 1871	<u>Lutjanus vivanus</u>	(WA)
<u>Sparus tranquebaricus</u> Shaw, 1803	<u>Lutjanus johnii</u>	(IP)
<u>Vegetichthys tumidus</u> Tanaka, 1917	<u>Paracaesio xanthurus</u>	(IP)
<u>Macolor typus</u> Bleeker, 1867	<u>Macolor niger</u>	(IP)
<u>Pristipomoides typus</u> Bleeker, 1852	<u>Pristipomoides typus</u>	(IP)
<u>Bowersia ulaula</u> Jordan & Evermann, 1903	<u>Pristipomoides sieboldii</u>	(IP)
<u>Genyoroge unicolor</u> Alleyne & Macleay, 1877	<u>Lutjanus adetii</u>	(IP)
<u>Lutjanus unimaculatus</u> Quoy & Gaimard, 1824	<u>Lutjanus fulviflamma</u>	(IP)
<u>Mesoprion uninotatus</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus synagrus</u>	(WA)
<u>Diacope vaigiensis</u> Quoy & Gaimard, 1824	<u>Lutjanus fulvus</u>	(IP)
<u>Sparus vermicularis</u> B. & S., 1801	<u>Lutjanus synagris</u>	(WA)
<u>Bowersia violescens</u> Jordan & Evermann, 1903	<u>Pristipomoides filamentosus</u>	(IP)
<u>Aprion virescens</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	<u>Aprion virescens</u>	(IP)
<u>Diacope viridis</u> Valenciennes, 1845	<u>Lutjanus viridis</u>	(EP)
<u>Diacope vitianus</u> Hombron & Jacquinet, 1853	<u>Lutjanus boutton</u>	(IP)
<u>Serranus vitta</u> Quoy & Gaimard, 1824	<u>Lutjanus vitta</u>	(IP)
<u>Bodianus vivanet</u> Lacepède, 1803	<u>Lutjanus griseus</u>	(WA)
<u>Mesoprion vivanus</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus vivanus</u>	(WA)
<u>Mesoprion xanthopterygius</u> Bleeker, 1849	<u>Lutjanus lutjanus</u>	(IP)
<u>Diacope xanthopus</u> Cuvier (in C. & V.), 1829	<u>Lutjanus fulvus</u>	(IP)
<u>Diacope xanthozona</u> Bleeker, 1845	<u>Lutjanus johnii</u>	(IP)
<u>Caesio xanthurus</u> Bleeker, 1869	<u>Paracaesio xanthurus</u>	(IP)
<u>Mesoprion yapilli</u> Cuvier (in C. & V.), 1828	<u>Lutjanus johnii</u>	(IP)
<u>Serranus zonatus</u> Valenciennes (in C. & V.), 1830	<u>Pristipomoides zonatus</u>	(IP)