



شكل ٥٠ . توزيع الجراد المهاجر وجراد الشجر في أفريقيا.



٥ - ٢ أنواع أخرى من الجراد

هناك أنواع أخرى عديدة هامة من الجراد، بالإضافة إلى الجراد الصحراوي والمعروفة بتكونه بتكوين أسراب في أفريقيا وأسيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية.

في إفريقيا (انظر شكل ٥١ و ٥٢)

الجراد المهاجر أو الرحال (*Locusta migratoria*)

التوزيع

توجد نويعات Subspecies من الجراد المهاجر تعيش في إفريقيا (*Locusta migratoria migratoria*)، وفي آسيا (*L.m. capito*)، وفي مدعشقر (*L.m. manilensis*)، وفي جنوب شرق: *L.m. burmana*، وفي جنوب غرب يوجد نوع هندي، وفي التبت (*L.m. migratoria*) وفي استراليا وأوروبا (الجزء الجنوبي: *L.m. cinerascens*) والجزء الشمالي: *L.m. migratoria*. وتتدخل مناطق انتشار الجراد الصحراوي والجراد الأفريقي المهاجر مع بعضها.

دوره الحية

مماثلة لدورة حياة الجراد الصحراوي، وفي العادة له جيلين في العام الواحد، وقد يصل إلى خمسة أجيال كما في الجراد الشرقي المهاجر (*L.m. manilensis*) حيث يتوقف ذلك على النوع ومكان التواجد.

الشكل الخارجي والمظهر

الحوريات الانفرادية تكون في البداية رمادية اللون ثم يتغير لونها بعد ذلك، الحوريات التجمعية لونها بني أو أسمر مع علامات سوداء. أما الحشرات الكاملة التجمعية فتأخذ اللون الرمادي وعندما تنضج جنسياً يتتحول اللون إلى المائل للبني. ورغم أن الجراد الأفريقي المهاجر مشابه للجراد الصحراوي، إلا أنه أكثر بدانة منه. كما قد يأخذ اللون الأصفر، ولكن لا يأخذ اللون القرنفل، كما يتلون الجزء أسفل الجناح في الحشرات الكاملة باللون المائل للأصفر.

السلوك

تتواجد مجموعات الحوريات في أغلب الأحوال بمراعي سهول الفيضانات، وتحرك ببطء، وهي أكثر كثافة منها في الجراد الصحراوي. وطيران الحشرات سريع و مباشر و عاده ينتهي بهبوط مفاجئ. وتطير الأسراب عادة على ارتفاعات منخفضة وبكتافات عالية جداً. يحدث تكوين الأسراب بصورة أقل في منطقة الشرق الأدنى وجنوب غرب آسيا.

جراد الشجر (نويعات انكريديم (*Anacridium spp.*)

التوزيع

تتواجد نويعات انكريديم في أنحاء إفريقيا والشرق الأدنى وجنوب أوروبا وجنوب غرب آسيا. وتتدخل مناطق توزيع جراد الشجر مع مناطق انتشار الجراد الصحراوي.

دوره الحية

تشبه دوره حياة الجراد الصحراوي، باستثناء أن الحوريات لها من ستة إلى تسعة أعمار وفي العادة هذا النوع من الجراد له جيل واحد في السنة.

الشكل الخارجي والمظهر

يأخذ جراد الشجر اللون الرمادي أو البني (الأسمى)، والجناح الخلفي شفاف أو ضارب إلى اللون الارجوانى مع وجود قوس داكن يختلف حجمه تبعاً لنوعه. ويتسم الجسم بالبدانة والصلابة.

السلوك

يتواجد في مناطق السافانا القاحلة على الأشجار والشجيرات. ونادرًاً ما تشكل الحوريات مجموعات. وطيران الحشرات الكاملة بطء وثقل، وحجم الأسراب أصغر وأقل حركه منها في الجراد الصحراوي.

شكل ٥١ . توزيع الجراد الأحمر والجراد البنى فى أفريقيا .



الجراد البنى أو الأسمر (*Locustana pardalina*)

منطقة غزو

أ

منطقة انحسار



الجراد الأحمر (*Nomadacris septemfasciata*)

منطقة غزو

ب

منطقة تفشي



الجراد الأحمر (*Nomadacris septemfasciata*)

التوزيع

ينتشر بأفريقيا الجنوبية، وبدرجة أقل في مدغشقر وموريتنيوس والرأس الأخضر (كاب فيردي) وحوض بحيرة تشاد ودلتا سهول الفيضانات بالنيجر. وتعد سهول الفيضانات من البيئات المفضلة له.

دوره الحيا

يتكون طور الحوريه من ٦ - ٨ أعمار، ويستمر هذا الطور حوالي شهرين. وتظل الحشرات الكاملة غير ناضجة جنسياً لفترة تتراوح مابين ١١-١٠ شهراً. وله جيل واحد في السنة.

الشكل الخارجي والمظهر

يتشابه الجراد الأحمر مع الجراد الصحراوي في شكل الجسم، ولكنه أطول منه. والحشرات الكاملة الغير ناضجة جنسياً تأخذ اللون البني الذي يتحول إلى اللون الضارب للحمراء مع تقدم العمر، مع وجود شريط أصفر مميز على الرأس، وسلسلة من الشرائط الداكنة الواضحة عبر الجناح الأمامي، وقاعدة الجناح الخلفي خاربة للحمراء.

السلوك

طيرانه على شكل تحليق في الجو الذي ينتهي عادة باندفاع في اتجاه رأسى داخل الحشائش.

الجراد البني أو الأسمر (*Locustana pardalina*)

التوزيع

يوجد بأفريقيا الجنوبية خلال الأوبئة، وفي جنوب أفريقيا ونамиبيا خلال فترات الانحسار

دوره الحيا

طور البيض مقاوم للجفاف، حيث يمكن أن يبقى البيض حياً لأكثر من ثلاثة شهراً ويدخل بيض الحشرات ذات المظهر الانفرادي فترة سكون تتراوح من ١ - ٣ شهور بينما لا يوجد ذلك في الحشرات ذات المظهر التجمعي. وتوجد خمسة أعمار في طور الحوريه تستغرق حوالي شهراً حتى تستكمل نموها. وله من جيلين إلى أربع جيلات في السنة الواحدة.


الشكل الخارجي والمظهر

تأخذ الحشرات الكاملة الانفرادية اللون الأخضر إلى الرمادي، أما الحشرات التجمعية فتأخذ اللون البني إلى الأصفر / البني، وهي متوسطة الحجم وتتميز بلون يميل إلى الزرقه الخفيف أسفل الجناح. وتظهر الحوريات بألوان تعد كخلفية، تصبح بعد ذلك سوداء وبرتقالية على نحو منتظم عند وجودها في مجموعات.

السلوك

تطير أسراب الجراد البني لمسافات تتراوح مابين ٨٠ - ١٠٠ كم في اليوم الواحد. ومن الشائع قيام الحشرات بالهجره الجماعيه خلال أمسيات الصيف. وتوجد مجموعات الحوريات جاثمه في تكتلات مدمجة كثيفة على الأجزاء العليا من الشجيرات، ويمكن ملاحظتها على امتداد العديد من الكيلومترات.

شكل ٥٢ . توزيعات الجراد الإيطالي والجراد المغربي (المراكشى) وجراد بمبای، في أوروبا وشمال أفريقيا وأسيا.



في أوروبا وشمال أفريقيا وأسيا (انظر شكل ٥٢)

الجراد المهاجر أو الرحال (*Locusta migratoria* ssp .)

ارجع إلى الجزء الخاص بأفريقيا

(*Calliptamus italicus*) كاليبتامس ايتاليكس

التوزيع

من أوروبا الغربية وشمال أفريقيا خلال الجمهوريات الآسيوية الوسطى.

دورة الحياة

يحدث الفقس في الفترة من أبريل إلى يونيو. ويكون طور الحوريه من خمسه أعمار في الذكور، وسته في الإناث. وتظهر الحشرات الكامله من مايو حتى يونيو ويحدث وضع البيض من يونيو إلى سبتمبر وله جيل واحد في السنة مع فتره سكون للبيض خلال الخريف والشتاء.

الشكل الخارجي والمظاهر

يتسم شكله بالقصير والبدانه وهو أصغر من الجراد الصحراوي.

(*Dociostaurus maroccanus*) دوسيوستورس ماروكانوس

التوزيع

من شمال غرب أفريقيا والجنوب الغربى لأوروبا إلى آسيا الوسطى.

دورة الحياة

يبدأ وضع البيض بعد ظهور الحشرات الكامله بحوالى شهر، من يونيو فصاعداً. ويقضى البيض فتره الشتاء ساكنا ثم يفقس فى مارس التالى أو أبريل. ويكون طور الحوريه من خمسه إلى ستة أعمار. وله جيل واحد فى السنة.

الشكل الخارجي والمظاهر

في العادة تأخذ الحوريات اللون الأسود مع علامات بنية (سمراء)، أما الأسراب فلونها بنى (أسمر).

(*Nomadacris succincta*) جراد بمبای

التوزيع

جنوب غرب وجنوب شرق آسيا

دورة الحياة

تظل الحشرات الكامله غير ناضجه جنسيا خلال الموسم البارد الجاف. وله جيل واحد في السنة.


الشكل الخارجي والمظاهر

الحوريات خضراء اللون مع بقع سوداء، تصبح عرضه للتغير في الأعمار اللاحقه - ويشبهه في هيئته وسلوكه الجراد الأحمر. وشكل الجسم متشابه مع الجراد الصحراوي، ولكن أطول منه.

السلوك

يشبه سلوك الجراد الأحمر.

شكل ٥٣ . توزيع أنواع الجراد الهامه في أستراليا.



في استراليا (انظر شكل ٥٣)

الجراد الاسترالي الوبائي (*Chortoicetes terminifera* تيرميسيتس تيرمييفرا)

التوزيع
استراليا
دورة الحياة

يقضى البيض فتره الشتاء (مايو الى سبتمبر) ساكنا. ويكون طور الحوريه من ٦ - ٥ اعمار، تستغرق فتره نمو تتراوح من ٤ - ٦ أسابيع تقريبا. وتبدا الحشرات الكامله في الظهور خلال ديسمبر، ويتبع ذلك جيل ثان يضع بيضاً يفقس خلال يناير/ فبراير. وقد يظهر جيل ثالث من مارس إلى مايو. ولهذا النوع من الجراد جيلين إلى أربعه أجيال في السنه تبعاً للظروف.

الشكل الخارجي والمظهر
أصغر أنواع الجراد الاسترالي ومن السهل الخلط بينه وبين النطاطات. وتخالف الحشرات الكاملة في درجات الألوان البني أو الرمادي أو الأخضر، وأطراف الأجنحة الخلفية داكنة اللون أما الحوريات فألوانها تميل إلى البني أو الأسمر.

السلوك
تتجمع الحشرات الكاملة معاً عند وضع البيض. وتشكل الحوريات مجموعات كثيفة ويمكن للأسراب أن تهاجر لمسافات تبلغ ٦٠٠ كم في الليلة الواحدة. وعند توافر الظروف الملائمه، يمكن أن تظهر الأجيال خلال عام واحد.

الجراد ذو الحلق المهمازي (*Austracris guttulosa* اوستراسرس جتولوسا)

التوزيع
استراليا وأندونيسيا وفي بعض الجزر جنوب المحيط الهادئ.

دورة الحياة
يُوضع البيض من أكتوبر إلى يناير، وأحياناً يمتد إلى أبريل. وطور الحوريه يتكون من ٦ - ٨ اعمار تستغرق عشره أسابيع لتنتكامل نموها. وتبدا الحشرات الكامله في الظهور في مارس تقريباً وتقضى الشتاء ثم تنضج جنسياً. وتعيش الحشرات الكامله من ١٠ - ١٢ شهر. وله جيل واحد في السنه.

الشكل الخارجي والمظهر
حجمه كبير وبه مهماز يظهر بين الرجلين الأماميتيين والحشرات الكامله لونها بني شاحب مع شرائط بيضاء وعلامات داكنه. وتتغير ألوان الحوريات من الأخضر الزاهي (اللامع) إلى البني الشاحب.

السلوك
تظل الحوريات في المظهر الانفرادي ولا تتشكل مجموعات ويأخذ هذا النوع من الجراد من ٣ - ٤ سنوات حتى يصل إلى الحاله الوبائيه.

الجراد المهاجر أو الرحال (*Locusta migratoria* ssp. *migratoria*)

ارجع إلى الجزء الخاص بأفريقيا

شكل ٥٤ . توزيع أنواع الجراد الهامه في أمريكا الجنوبيه.



شستوسركا بيسيفروننس *Schistocerca Piceifrons*

شستوسركا كانسيلاتا *Schistocerca Cancellata*

في أمريكا الجنوبيّة (انظر شكل ٥٤)

جراد أمريكا الوسطى (*Schistocerca piceifrons*)

التوزيع

المكسيك جنوب مدار السرطان وإلى أسفل ٢٠٠٠ م في أمريكا الوسطى (*S.p. piceifrons*). وفي بيرو وأكوادور ١٢٠٠ - ٢٢٠٠ م (*S. p. peruviana*)

دوره الحيّاه

يحدث التكاثر مع بداية المطر. ويقضي الشتاء كحشره كامله. وله جيلين خلال الأمطار الصيفية

الشكل الخارجي والمظاهر

لون الحوريات الانفرادية أخضر، أما التجمعية فلونها أسود وقرنفل. ولون الحشرات الكاملة التجمعية أصفر زاه.

السلوك

توجد عشائر هذا النوع من الجراد بصفه دائمه على ساحل المحيط الهدى في أمريكا الوسطى وشمال هندورس وشبه جزيرة يوكاتان (*S.p. piceifrons*), وفي بيرو الوسطى (*S.p. peruviana*). وتحدث الأوبئه عندما تهاجر الأسراب من مناطق التكاثر الدائمه .

جراد أمريكا الجنوبيّة (*Schistocerca cancellata*)

التوزيع

الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبيّة.

دوره الحيّاه

تشبه دوره حيّاه الجراد الصحراوي.

الشكل الخارجي والمظاهر

مشابه للمظهر الانفرادي والمظاهر التجمعي في الجراد الصحراوي

السلوك

توجد عشائر هذا النوع من الجراد في أجزاء من شمال غرب الأرجنتين والمناطق المجاورة لبوليفيا وباراجواي. وسلوكيه يشبه سلوك الجراد الصحراوي. وتحدث الأوبئه عندما تهاجر الأسراب من مناطق التكاثر الدائمه .