

**Tabla 10. Ejemplo de una tabla de alimentación para el salmón del Atlántico (% peso corporal/día)**

PC (g)	4 °C	8 °C	12 °C	16 °C	18 °C
<b>Agua dulce</b>					
<0.3	<i>ad libitum</i>				
0.3–0.8	2.0	3.0	4.0	4.5	4.5
0.8 - 5.0	1.8	2.7	3.5	3.9	3.9
5.0–10.0	1.6	2.1	3.1	3.4	3.4
10.0–25.0	1.4	2.0	2.7	3.1	3.0
25.0–40.0	1.0	1.6	2.2	2.7	2.6
40.0–60.0	1.0	1.3	2.0	2.6	2.5
<b>Agua de mar</b>					
80–200	1.5	1.9	2.2	2.8	
200–300	1.3	1.9	2.3	2.6	
300–500	1.2	1.7	2.0	2.3	
500–775	1.0	1.4	1.7	2.0	
775–1 000	0.8	1.0	1.5	1.8	
1 000–1 250	0.7	1.0	1.3	1.5	
1 250–1 500	0.6	0.9	1.2	1.4	
1 500–2 000	0.5	0.7	1.1	1.2	
2 000–3 000	0.5	0.7	0.9	1.1	
3 000 +	0.5	0.6	0.9	1.0	

Fuente: Lall (2009, Datos sin publicar)

El apetito se reduce de drásticamente a bajas temperaturas.

Niveles bajos de oxígeno a temperaturas altas afectan la ingesta de alimentos.