

Tabla 14. Fórmulas de alimentos (composición de ingredientes) y composición proximal de alimentos preparados en granja más comúnmente utilizados para diferentes etapas de vida de la tilapia del Nilo en sistemas semiintensivos de cultivo, Tailandia

Ingrediente/composición aproximada		Etapa de vida/clase de talla			
		Cría	Juvenil	Engorda (en jaula)	Engorda (en estanque)
Composición de ingrediente (%)					
	Almidón de mandioca	15	0	0	0
	Harina de mandioca	0	23	23	22
	Harina de coco	0	0	0	30
	Salvado de arroz	30	15	20	0
	Harina de soya	0	30	25	25
	Harina de pescado	47	25	25	20
	Aceite de pescado	5	4	4	0
	Fosfato dicalcio	1	1	1	1
	Pre-Mezcla de vitaminas y minerales*	2	2	2	2
Composición proximal (%)					
	Materia seca	8.3	9.0	9.0	9.1
	Proteína cruda	30.0	31.0	30.0	29.9
	Lípido crudo	10.0	7.4	7.5	4.1
	Ceniza	16.3	12.6	12.8	10.7
	Fibra cruda	3.8	4.2	4.4	6.0
	NFE	31.6	35.8	36.3	40.2
	Energía bruta (kcal/kg de alimento)	2,800	2,700	2,700	2,500
	Costo (Baht/kg)	15.1	11.3	10.7	8.5
	Costo (US\$/kg)	0.45	0.34	0.32	0.26

*Referirse a las Tablas 24 y 25 para detalles de las premezclas de vitaminas y minerales más comúnmente utilizadas

Fuente: Thongrod (2007)